編　　號：391

甘遂

別　　名：苦澤、甘澤、腫手花根

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia kansui* T.N.Liou. exT.P.Wang

生育特徵：多年生肉質草本，葉狹披針形或線狀披針形，莖直立，淡紫紅色，單葉互生。聚繖花序，黃花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：塊莖。

主要成分：含α-，r-大戟甾醇(α-，r-euphorbol)，甘遂甾醇(tirucallol)並含 13-氧化巨大戟萜醇(13-oxyingenol)，甘遂萜酯 A`B(kansuinineA`B)。

功　　效：春季開花前或秋末莖葉枯萎後來挖，撞去外皮，晒乾，生用或醋制用，瀉水逐飲，用於水腫脹滿胸腹積水，痰飲積聚、氣逆喘咳、二便不利。

產　　地：中國、台灣。

編　　號：392

泰國葛

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Pueraria mirifica*

生育特徵：多年生藤本，葉為三出複葉，小葉長橢圓形。根莖肥大。

繁殖方法：組培法繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：含澱粉及性腺激素。

功　　效：根為發汗、解熱、治熱性病、口渴、嘔氣、頭痛、醉酒、嘔吐。葉治創傷。亦作澱粉用，並含性腺激素可刺激乳線發育，肥大胸部。

產　　地：泰國、緬甸、寮國、台灣、新竹。

編　　號：393

香水茅

別　　名：香茅、香茅草

科　　名：禾本科(Gramineae)

學　　名：*Cymbopogon nardus* Rendl. var. *genuinns* Honda

生育特徵：多年生草本，高約80-150cm，葉長線形平行脈。叢生。圓錐花序，開白色花，穎果。

繁殖方法：分枝法繁殖。

利用部位：葉、根。

主要成分：採葉及根含精油。

功　　效：去風止癢、治皮膚病。且為肥皂及防蟲藥劑香料。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：394

颱風草

別　　名：風颱草、大風草

科　　名：禾本科(Gramineae)

學　　名：*Setaria palmfolia* Stapg.

生育特徵：多年生草本，葉呈披針形。穗狀花序，開綠白花。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。

利用部位：根、全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採莖葉治關節炎。根治胃腸虛弱，消化不良，食慾不振。癰瘡。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：395

台灣半夏

別　　名：犁頭草、土半夏
生半夏、青半夏。
科　　名：天南星科(Araceae)
學　　名：*Typhonium divaricatum* (L.) Dence
生育特徵：多年生宿根草本，根莖肥大，葉呈犁頭形，由基部抽花，帶紫藍色。
繁殖方法：塊莖法繁殖。
利用部位：塊莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採塊莖，為解毒藥。有毒、外敷毒蛇傷、癰疽。治咳嗽、感冒。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：396

拔契

別　　名：鬣殼刺、鬣殼藤、狗骨刺
科　　名：百合科(Liliaceae)
學　　名：*Smilax china* L.
生育特徵：多年生藤本灌木，葉圓形，由葉腋抽花穗，結漿果。
繁殖方法：塊莖法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根莖。
主要成分：含薯蕷皂甙元。
功　　效：可祛風利濕、解毒消腫、利尿。塊莖治多尿、滑數不禁，根治乳糜尿、赤白痢、食道癌、糖尿病、筋骨酸痛、腰扭傷。晒乾的則可治筋骨麻木，其須浸酒服。
產　　地：台灣、新竹。

千斤藤

編　　號：397
別　　名：千金藤、犁壁藤
　　　　　犁壁陳
科　　名：防己科
　　　　　(Menispermaceae)
學　　名：*Stephania japonica* (Thunb.) Miers.
生育特徵：多年生宿根藤本，葉呈圓形、心形、寬卵形及卵形。花單性，聚繖花序，腋生，淡綠色，核果。
繁殖方法：塊莖法繁殖。
利用部位：根、莖葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全株治跌打、風濕。塊根治毒蛇咬傷。
產　　地：台灣、新竹。

金絲草

編　　號：398
別　　名：筆仔草
科　　名：禾本科(Gramineae)
學　　名：*Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth.
生育特徵：多年生草本，叢生，葉互生，葉片線狀披針形。穗狀花序，開黃色花，穎果。
繁殖方法：分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草，解熱、消炎、利尿。治血症、腫毒、中暑、感冒發熱。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：399

野生土豆

別　　名：陳莢豆、山土豆

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Alysicarpus vaginalis* (Linn) De Candolle

生育特徵：原生於平野草原中，匍匐性於地面，葉三出葉，小葉橢圓形。花腋生，開花於地面，黃色花，結果於地中，莢果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草、果實。

主要成分：生物鹼。

功　　效：果實健脾胃。全草，味甘、苦性涼。有活血通絡、接骨消腫、清熱解毒之效。治跌打骨折、筋骨酸痛、外傷出血、瘡瘍潰爛久不收口、腮線炎、慢性肝炎。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：400

紫花野牡丹

別　　名：野牡丹、九螺花、埔筆仔金榭榴、金石榴、地茄。

科　　名：野牡丹科(Melastomataceae)

學　　名：*Melastoma candidum* D.Don.



生育特徵：多年生草本，葉互生，葉呈橢圓形、廣披針形。花單性，腋生，開紫色花，漿果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、幹。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根、幹(稱王不留行)：消炎、驅風、除濕、傷科、肺癰、風濕良藥及治胃病。葉：活血消腫，清熱解毒。果可食，花色極為艷麗。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：401

泰國樹蘭

別　名：秋蘭、樹蘭花
科　名：楝科(Meliaceae)
學　名：*Aglaia odorata* Lour
生育特徵：多年生灌木或小喬木。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、枝葉及花。
主要成分：生物鹼。
功　效：根有解熱之效。治咳嗽。枝葉有強壯之效。治月經過多，跌打、疽瘡。花有解鬱寬中、清肺、醒頭目、醒酒、止煩渴、催生之效。
產　地：泰國、台灣、新竹。

編　號：402

雲南黃馨

別　名：黃素馨、黃馨、秀英花
科　名：木犀科(Oloeaceae)
學　名：*Jasminum officinale* L.
生育特徵：多年生藤本。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：花。
主要成分：含精油。
功　效：其花解心氣鬱痛、止下痢腹痛。並為包種茶賦香料。
產　地：雲南、台灣、新竹。

黃蝦花

編　　號：403
科　　名：爵床科(Acanthaceae)
學　　名：*Pachystschys lutea*
生育特徵：為常綠小灌木，春到秋季都開花，頂生花序，如穗狀，鮮黃色苞片密生，直立，二唇狀，花姿皆似小蝦而得名，喜高溫，耐旱。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：消炎、解熱、退肝火。
產　　地：台灣、新竹。

厚葉女貞

編　　號：404
別　　名：日本女貞、東女貞
　　　　　女貞木、冬青木、鼠梓。
科　　名：木犀科(Oloeaceae)
學　　名：*Lignstrum japonicum* Thunb.
生育特徵：多年生小喬木，葉互生，呈橢圓形，長橢圓形。白色花，核果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：種子、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採種子晒乾稱女貞子，為強壯劑。葉清熱解毒、治火眼、口乾、乳癰、腫毒。
產　　地：日本、台灣、新竹。

編　　號：405

紅柏

別　　名：刺柏、紅心柏、真珍柏
　　　　　珍珠柏、紫柏、松葉柏

科　　名：柏科(Cupressaceae)

學　　名：*Sabina chinensis* (Linn) Antoine.

生育特徵：常綠灌木至喬木。葉二型，一為鱗狀葉，常四枚交互對生，一為針狀葉，3 枚交叉輪生。毬果近圓形，紫褐色或暗褐色，披白粉。種子卵圓形，褐色，花果期 5-2 月。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：細枝葉、根皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全年採細枝葉，根皮，有祛風、散塞、活血、止血、利尿、消腫、解毒殺蟲、去穢、治風寒感冒、肺結核、風濕關節痛、尿路感染、腫毒、蕁麻疹、吐血、衄血、痔血、子宮出血、月經不調、便血、膀胱炎、尿道炎。

產　　地：中國大陸、韓國、日本、台灣、新竹。

編　　號：406

紅桂花

別　　名：青紫木、紅背桂、葉背紅
　　　　　紅背桂花、箭毒木

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Excoecaria cochinchinensis* Lour.

生育特徵：常綠灌木，全株光滑無毛，內含白色乳汁。葉對生，葉片卵狀披針形，長 8-15cm 寬 3.5-5cm，上面深綠色，背面鮮紫紅色，花淡黃色，蒴果，花果期 5-12 月。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草通經活絡、解毒、止痛、治吐血、腮腺炎、扁桃腺炎、乳腺炎、心絞痛、胃絞痛、腰肌勞損、風濕疼痛、跌打腫痛、痲疹、赤痢。外用治皮膚疥癬、神經性皮炎。

產　　地：越南、亞熱帶地區、台灣、新竹。

編　號：407

軟枝黃槐

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Cassia glauca* Lam. (*Cassia surattensis* Burm.f.)

生育特徵：多年生灌木，葉對生，呈卵形、橢圓形。花自腋生，開黃花，莢果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹皮、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：樹皮及葉治痛風、糖尿病、淋病。

產　地：台灣、新竹。

編　號：408

明日葉

別　名：長壽草、靈草
海峰人參、珍立草
神仙草、大本芹葉

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Angelica keiskei* KOIDZ.

生育特徵：多年生草本，葉為掌狀分裂，裂片橢圓形、披針形。花為繖形花序，開白花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草都可當藥用，為癌症之預防、治療。防止老化、中風等功用。

產　地：日本八丈島、台灣、新竹。

金錢樹

編　　號：409

別　　名：雪鐵芋

科　　名：天南星科(Araceae)

學　　名：*Zamioculcas zumiifolia*

生育特徵：常綠草本植物，全株光滑無毛，高 25-50 公分。葉條形，厚質，葉肉厚，塊莖分枝，可用分株法繁殖。

繁殖方法：分株法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：為解熱消炎等用、並具觀賞。

產　　地：非洲、台灣、新竹。

鐵掃把

編　　號：410

別　　名：松葉蘭、松葉蕨
鐵石松、石寄生

科　　名：松葉蕨科(Psilotaceae)

學　　名：*Psilotum nudum* (L.) Beauv.

生育特徵：多年生草本，葉針葉狀。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草治跌打損傷、吐血、風濕麻木、肺結核、腎炎水腫、痢疾。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：411

楦梧

別　　名：福建胡頹子

科　　名：胡頹子科(Elaeagnaceae)

學　　名：*Elaeagnus oldhamii* Maxim.

生育特徵：常綠直立灌木，葉倒卵形至卵狀矩圓形，採收根莖。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：根幹。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根治風濕性關節炎、腎虧腰痛、遺精、小便白濁、腰酸背痛、月內風、胃熱口渴、產後口渴、肺炎、肺癰、手風、腳風、風濕疼痛、小兒麻痺。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：412

樹薯

別　　名：木薯、番薯樹

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Manihot utilissima* Pohl.

生育特徵：多年生灌木，葉呈掌狀分裂，裂片橢圓形、長橢圓形、披針形。

繁殖方法：扦插法繁殖。

利用部位：根、樹皮。

主要成分：含澱粉。

功　　效：樹皮治僂麻質斯。塊根可食亦可製澱粉。根有清熱、解毒、殺蟲之效。

產　　地：台灣、新竹。

竹葉三七

編　號：413

別　名：薑三七、土三七

科　名：薑科(Zingiberaceae)

學　名：*Stahlianthus involucratus* (king ex Bak.)Craib

生育特徵：多年生宿根草本，葉互生，廣披針形，花淡黃色。

繁殖方法：塊莖繁殖。

利用部位：塊莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：塊莖：治跌打瘀痛、風濕骨痛、吐血衄血、月經過多、毒蛇咬傷，水煎服或浸酒服。毒蛇咬傷可研末外敷。

產　地：台灣、新竹。

雞母珠

編　號：414

別　名：相思子、紅珠木
相思豆、紅豆
美人豆、土甘草。

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Abrus precatorius* L.

生育特徵：多年生灌木，葉呈羽狀複葉。結莢果。種子紅色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草、種子。

主要成分：生物鹼。

功　效：種子利尿，治支氣管炎、蟲積、淋肝炎、黃疸、傷暑、月經過多。

產　地：台灣、新竹。

編　號：415

台灣玉竹

別　名：玉竹、明玉竹、尾參
山尾參、萎蕤
科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Polygdonatum officinale* All
生育特徵：多年生宿根草本，葉互生，呈橢圓形、披針形。
繁殖方法：塊莖繁殖。
利用部位：根莖。
主要成分：生物鹼。
功　效：4-10 月採收，10 月較佳，掘取根莖，去莖葉與鬚根，洗淨曬乾稱玉竹為強壯劑。治體弱多尿、多汗、遺精、腰酸。
產　地：台灣、新竹。

編　號：416

小葉蘆薈

科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Aloe vera* L.
生育特徵：多年生草本，具短莖，葉之排列呈蓮座狀肥厚多汁，邊緣疏生刺，葉小。總狀花序，從葉叢生抽出，具多數黃色之小花。
繁殖方法：分枝法繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：葉清熱、通便、殺蟲、美容及治肝病。亦可當野菜用。
產　地：台灣、新竹。

樹豆

編　號：417

別　名：木豆、觀音豆
豆蓉、埔姜豆

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Cajanus cajan* (L.) Millsp

生育特徵：常綠亞灌木，葉卵狀披針形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實、葉、根。

主要成分：生物鹼。

功　效：採集果實、葉、根可清熱解毒、補中益氣、利水消食排癰腫、止血、止痢。果實治肝、腎水腫、血淋、痔瘡下血、癰疽初起。根治手腳發軟、黃疸性肝炎、關節痛、跌打損傷、全株治尿血。樹豆葉搗汁滴耳內治中耳炎。

產　地：台灣、新竹。

巴豆

編　號：418

別　名：巴仁、江子、巴果、紅子仁

科　名：大戟科(Eupforbiaceae)

學　名：*Fructus Crotonis*

生育特徵：常綠小喬木，葉卵形或長圓狀卵形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子。

主要成分：種子含巴豆油，其中有油酸、豆油酸、巴豆油酸(crotonic acid)順芷酸(tiglic acid)等的甘油脂，尚含巴豆苷(crotonoside)。

功　效：性熱、味辛、有大毒、外用蝕疱，用子惡疱、疥癬、疣痔。

產　地：台灣、新竹。

編　號：419

廣防風

別　名：白花前胡、岩風、雞腳前胡
宮前胡、山獨活、信前胡
廣西防風

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Peucedanum praeruptorum* Dunn.

生育特徵：多年生草本，掌狀裂葉，裂片條形、線形。繖形花序，開淡白色花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　效：本品為前胡二大原料之一，採根，治感冒咳嗽、胸肋脹滿、痰調喘息嘔逆等。

產　地：中國、台灣、新竹。



編　號：420

小葉蟛蜞菊

別　名：小號黃花蜜菜
單葉蟛蜞菊

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Wedelia prostrata* (Hook at Arn) Hcmsley.

生育特徵：多年生草本，匍匐性，葉互生，橢圓形、披針形，花自葉腋生，黃花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草清熱解毒、治肝炎、氣管炎。搗敷刀傷。

產　地：台灣、新竹。

假三捻

編　　號：421
別　　名：香葵
科　　名：錦葵科(Malvaceae)
學　　名：*Abelmoschus moschatas* (L.) Medic
生育特徵：一年生或越年生草本，葉互生，廣卵形、橢圓形。花自葉腋生，黃花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根，清熱、散毒、治白濁。
產　　地：台灣、新竹。

防葵

編　　號：422
別　　名：房葹、牡丹防風食用防風、防風
科　　名：繖形科(Umbelliferae)
學　　名：*Peucedanum japonicum* Thunb
生育特徵：多年生宿根草本，葉呈掌狀形分裂，裂片條形、針形。繖形花序，淡黃色花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根治感冒、咳嗽、痛風、膀胱及腸疾患。嫩莖葉供食用。
產　　地：自生台灣北部海岸之石門、野柳及彭佳嶼、綠島海濱等地、新竹。

編　　號：423

飛龍掌血

別　　名：小葉黃肉樹、細葉黃肉刺黃樹根藤
科　　名：芸香科(Rutaceae)
學　　名：*Toddalia asiatica* (L.) Lam
生育特徵：多年生灌木或小喬木，葉呈針刺狀形，小葉。
繁殖方法：實生法繁殖、穗接法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根或根皮，葉：去袪風、止痛、散瘀、止血。治風濕疼痛、胃痛、跌打損傷、吐血、衄血、刀傷出血、經閉、痛經。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：424

直立薄荷

科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Mentha canadensis* L.
生育特徵：多年生草本，葉卵形、橢圓形、披針形。花自葉腋生，唇形花，白色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼及精油。
功　　效：全草為驅風、治感冒、殺蟲、腹痛、提神。
產　　地：台灣、新竹。

椒草

編　號：425

別　名：小椒草、豆瓣綠

科　名：胡椒科(Piperaceae)

學　名：*Peperomia reflexa* (Linnaeus f) Dietrich

生育特徵：多年生草本，葉互生，廣卵形。穗狀花序，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草，味辛、苦、性微溫。有祛風除濕、舒筋活血、止咳化痰之效。治風濕筋骨痛、跌打損傷、瘡癤腫毒、口腔炎、痢疾、宿食不消、癆傷咳嗽、小兒疳積、百日咳、哮喘。

產　地：台灣野生、新竹。



小葉厚殼樹

編　號：426

別　名：福滿木、福建茶

科　名：紫草科(Boraginaceae)

學　名：*Ehretia microphylla* Lamark

生育特徵：多年生常綠灌木，高 1-3m，多分枝葉簇生，葉片倒卵形或匙狀倒卵形，葉長 1-4cm，葉寬 0.5-2cm，聚繖花序，花白色，核果球形，花果期 3-10 月。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：根幹或葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根及粗莖與葉即全株有利濕、行血、解毒之效。治風濕骨疼、筋骨疼痛、咯血、便血。葉治疔瘡。

產　地：中國、福建、廣東、廣西、琉球、菲律賓及東南亞、印度及台灣、新竹。

編　　號：427

貼梗海棠

別　　名：宣木瓜

科　　名：薔薇科(Rosaceae)

學　　名：*Chaenomeles lagenaria* (Lois koidz)

生育特徵：多年生草本，葉互生，呈卵形、橢圓形。花單生，花自腋生，開紅色花，核果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採果實為濕腫足膝無力、霍亂、轉筋氣脫。

產　　地：中國中部及台灣、新竹。

編　　號：428

金粟蘭

別　　名：珠蘭、雞腳蘭、魚子蘭、珍珠蘭、真珠蘭、雞爪蘭、茶蘭

科　　名：金粟蘭科(Chloranthaceae)

學　　名：*Chloranthus spicatus* (Thunb.) Makino

生育特徵：多年生草本。

繁殖方法：分枝法繁殖。

利用部位：根、全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根，解毒狐、敷瘡去風、擦風癬最妙。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：429

野牡丹

別　名：九螺花、埔筆仔
金榭榴、金石榴
科　名：野牡丹科
(Melastomataceae)
學　名：*Melastoma candidum* D.Don
生育特徵：多年生草本，葉卵形、廣卵形。開淡紫色花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：全年採根及幹，切片，曬乾稱王不留行、不留行。為消炎、驅風、除濕乃傷科、肺癰、風濕良藥。葉治胃痛。
產　地：台灣、新竹。



編　號：430

紅葉野牡丹

別　名：九螺花、埔筆仔
金榭榴、金石榴
科　名：野牡丹科
(Melastomataceae)
學　名：*Melastoma candidum* D.Don
生育特徵：多年生草本，葉為披針形、橢圓形。葉紅色，對生。花腋生，淡紅色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：全年採根及幹，切片，曬乾稱王不留行、不留行。為消炎、驅風、除濕乃傷科、肺癰、風濕良藥。葉治胃痛。
產　地：台灣、新竹。

編　號：431

小葉金絲桃

別　名：細葉金絲桃
科　名：福木科(Guttiferae)
學　名：*Hypericum erectum* Thunb var. *angustifolium* Y.Kimura
生育特徵：多年生草本，葉小，橢圓形。花自腋生，結核果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：葉治惡疽、胃痙攣、腫毒等。
產　地：台灣、新竹。



編　號：432

石龍芮

別　名：水堇、苦堇、胡椒蔡小水楊梅、鬼見愁
科　名：毛茛科(Ranumculaceae)
學　名：*Ranunculus sceleratus* L.
生育特徵：多年生草本，葉呈掌狀分裂，裂片橢圓形，全株有毛。開黃色花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含毛莨苷、原白頭翁素。
功　效：採全草治風濕痺，葉搗汁塗毒蛇咬傷。
產　地：中國、東北、台灣、新竹。

大青

編　　號：433
別　　名：觀音串、鴨公青、死人骨頭
臭根、野地骨、埔草樣
臭腥公、臭腥仔
科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　　名：*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz
生育特徵：多年生落葉小灌木，葉呈卵形或橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：全草含靛藍，黃色素及鞣質，根含烯萜類。
功　　效：味苦、寒、清熱、祛風除濕、涼血、止血。根治乙型腦炎、流腦、感冒發熱、腮腺炎、耳內風、熱痢、偏頭痛、高熱頭痛、風濕性關節痛、腸風下血、痲疹後之煩亂、痰多、黃疸、腰痛、肋膜炎、婦女下消、調經理帶、梅毒、胃火齒痛。
產　　地：台灣、新竹。

紫菀

編　　號：434
別　　名：青菀小瓣、返魂草、山白菜
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Aster tataricus* L. F.
生育特徵：多年生草本，葉呈長橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：根含柴苑酮(shionone)，槲皮素，尤羅萜，表尤羅萜和揮發油，尚含柴苑皂苷(astersapouin)，水斛得常春藤皂苷元(hederagenin)。
功　　效：根編成辮型後曬乾生用或蜜炙用，可潤肺下氣、消痰止咳，用於痰多喘咳、新久咳嗽、勞嗽咳血。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：435

雲南山澤蘭

別　　名：蘭草、水香、大澤蘭
燕尾香、香水蘭、孩兒菊
千金草、省頭草、女蘭
香草、醒頭草、佩蘭、澤蘭。
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Eupatorium fortunei* Turcz.
生育特徵：一年生或多年生草本，根莖橫走，莖直立，葉對生，葉片矩卵形或卵狀披針形，頭狀花序組合成聚繖花序，花紫紅色，瘦果圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全草有清暑、去穢，化胃、止嘔調經、理帶、治暑濕感冒、寒熱頭痛、發熱頭重、風寒鼻塞、神經性頭痛、傳染性熱病、胸悶腹脹、脘痞不肌、胃腹脹滿、腰腎痠痛、食慾不振、急性胃腸炎、肝病黃疸、糖尿病浮腫、消化不良、口臭、噁心、月經不調。
產　　地：中國北部、東南部及西南部大部地區、台灣、新竹。

編　　號：436

新竹腹水草

科　　名：玄參科
(Scropbulariaceae)
學　　名：*Veronicastrum simadai*
(Masamune) Yamazaki
生育特徵：多年生草本，葉長披針形。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全草利水、散瘀、消腫、解毒。治小便不利、水腫、肝炎、跌打、月經不調、疔瘡。
產　　地：台灣、新竹。

台灣附地草

編　號：437

別　名：附地菜、黃瓜菜
不食草、地錦草
血見愁。

科　名：紫草科(Boraginaceae)

學　名：*Trigonotis peduncularis* Benth

生育特徵：多年生草本。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草為祛風、解毒、活血、止血。治一切血瘀血滯之病、散血之功。

產　地：分布亞洲溫帶、台灣、新竹。



威氏鐵莧

編　號：438

別　名：鐵莧、人莧

科　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　名：*Acalypha australis*

生育特徵：多年生灌木，葉廣橢圓形。穗狀花序，開紅色花，蒴果。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草為刀傷藥、止瀉、解熱。主治腸炎、痢疾。外敷腫毒。

產　地：台灣、新竹。

編　號：439

蓼藺

別　名：蓼藍、大青葉、青葉、板蘭根

板藍根、青黛、靛藍。

科　名：蓼科(Polygonaceae)

學　名：*Polygonum tinctorium* Lour

生育特徵：多年生草本，葉互生，橢圓形、披針形。花頂生，腋生，開淡紅色或白色花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：(一)葉治熱毒斑狂喉痺熱痢。葉汁為解毒藥，汁塗五心、止煩悶、藍實解諸毒、塡骨髓、明耳目。(二)莖或根：清熱、破血、解毒、涼血。(三)大青加鹽耑入腎經，堅骨固齒。(四)青黛及靛藍，夏秋採葉 130 公斤，置缸內，放清水浸 2-3 日，去枝條，加石灰 13 公斤，充分攪拌至浸液由烏綠色變深紅色，撈出泡沫，曬乾稱青黛，約 0.2 公斤，質量好，沈澱 2-3 小時後，將沈澱過濾，曬乾稱靛藍，約 30 公斤，味鹹寒、清熱解毒、散淤消腫、主治驚癇疳熱、失血、濕毒瘡腫。青黛，味鹹，性寒、無毒、解諸葉毒、小兒暑熱、驚癇發熱、天行頭痛寒熱、井水煎服之。亦磨敷熱瘡惡腫、金瘡下血、蛇犬等毒、解小兒疳熱殺蟲、小兒丹熱、和水服之瀉肝、散五臟鬱火、解熱、消食積、去熱煩、吐血、喀血。

產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：440

黃荊

別　名：七葉埔姜、埔姜

科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　名：*Vitex negundo* L.

生育特徵：多年生落葉灌木或小喬木，葉橢圓狀卵形。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根、葉、果、子。

主要成分：生物鹼。

功　效：子治傷寒發熱呃逆者、哮喘、肝胃痛。果治胃潰瘍、慢性胃炎。枝治火燙傷成瘡。根治瘧疾、風濕關節痛、腰痛。汁治腳蛀(腳癬)毒蛇咬傷、滿身紅腫發泡、外傷、犬及蜈蚣咬傷。根治青光眼、頭風、糖尿病。其味辛苦，溫，可祛風、除痰、行氣、止痛。

產　地：台灣、新竹。

編　號：441

睫穗蓼

科　名：蓼科(Polygonaceae)

學　名：*Polygonum longisetum* De Bruyn

生育特徵：多年生草本。叶長橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草搗爛敷腫。

產　地：台灣、新竹。



編　號：442

山菊

別　名：大吳風草、獨腳蓮

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Farfugium japonicum* (L.) Kitamura

生育特徵：多年生草本，葉形橢圓形或橢圓狀八角形。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：合雙稠吡咯啶生物鹼、克氏千里光鹼。

功　效：根治咽喉炎、扁桃腺炎、瘰癧、跌打損傷。草治感冒、流感、婦人乳癰初起、疔瘡潰瘍、可清熱解毒、活血。

產　地：台灣、新竹。

編　　號：443

戟葉蘭

別　　名：水犁壁

科　　名：蓼科(Polygonaceae)

學　　名：*Polygonum thunbergii* Sieb et Zucc .form.biconvexum (Hayata) Liu

生育特徵：一年生草本，莖有稜密生逆刺。葉互生，柄之內側溝狀，葉片戟形，中片橢圓形，全緣。兩面被白色粗毛。聚繖花序，雄8，雌3，瘦果卵形，具3稜。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：葉止癢，治瘰疬病煎服止血，葉敷用，亦為野菜用。

產　　地：台灣中北部、東部之原野至中海拔山區自生、新竹。

編　　號：444

金錢薄荷

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Glechoma hederacea* L. var. *grandis* Kudo

生育特徵：多年生草本，葉卵形。花腋生，開淡紫色花，蒴果。

繁殖方法：扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草解熱利尿、治結石。

產　　地：台灣、日本。

編　號：445

肥皂草

科　名：石竹科(Caryophyllaceae)

學　名：*Saponaria officinalis*

生育特徵：多年生草本，葉呈長橢圓形、長披針形。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草供洗滌用。

產　地：台灣、新竹。

編　號：446

海馬齒

別　名：海馬齒莧、蟳螯菜、蟳仔菜
濱馬齒莧、濱水菜

科　名：番杏科(Aizoaceae)

學　名：*Sesuvium portulacastrum* (L.) Linn.

生育特徵：多年生肉質草本，多分枝，匍匐，長 20-50cm，莖帶紫紅色，具白色小瘤點，葉對生，葉柄基部擴展而抱莖，邊緣膜質，葉片條狀倒披針形或條形，長 1.5-5cm，寬 3-7mm，先端鈍形，全緣、肉質。花單生葉脈，具梗、花色桃紅色或白色，蒴果卵形，種子細小，卵形，黑色。夏秋間盛花期。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全年採全草有解毒、消腫、止血之效。治蟳螯鉗傷、刮傷、刀傷。外用搗敷患部。

產　地：熱帶或亞熱帶海岸地區、福建、廣東及台灣沿海等地常見群生。

編　號：447

塔花

別　名：塔草、塔山澤蘭
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Eupatorium chinense* Linnaeus var. *tozananse*(Haya ta) Kitamura
生育特徵：習生山地荒坡上，多年生草本。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草、根。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草味苦、辛、性平、有清熱解毒、疏肝活血之效。治風熱感冒、胸痛、脫痛腹脹、跌打損傷、癰腫瘡毒、蛇咬傷。根味苦、甘性涼。有清熱利咽、涼血散瘀、解毒消腫之效。治咽喉腫痛、白喉、吐血、血淋、赤白下痢、水火燙傷。
產　地：台灣、新竹。

編　號：448

一枝香

別　名：傷寒草、生枝香
大號一枝香
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Vernonia cinerea* (L.) Less.
生育特徵：多年生草本，葉呈長橢圓形。花頂生，腋生，開黃色花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草治外感發熱、止咳。治痢疾、蛇傷。
產　地：台灣、新竹。

空心蓮子菜

編　　號：449
別　　名：空心蓮子草
　　　　　長梗滿天星
科　　名：莧科（Amaranthaceae）
學　　名：*Alternanthera philoxeroides* (Mog.) Griseb
生育特徵：多年生草本，葉長卵形、橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、莖葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根治乙型腦炎、帶狀疱疹、蛇傷。
產　　地：台灣、新竹

桔梗

編　　號：450
別　　名：鈴鐺花、白葯
　　　　　土人參、四葉菜。
科　　名：桔梗科(Campanulaceae)
學　　名：*Platycodon grandiflorum* (Jacq)
生育特徵：多年生草本，葉卵形或卵狀披針形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：含桔梗皀苷A.C.D.D2.(platycodin A,C,D,D2)，遠志皀苷 D1,D2 (polygalacin D1, D2)，以及植物甾醇、葡萄糖苷、氨基酸。
功　　效：可宣肺、利咽、祛痰、用於咳嗽痰多、胸悶不暢、咽喉腫痛、支氣管炎、肺癰瘍、胸膜炎。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：451

江某

別　名：鵝掌柴、鴨母爪、江梅
鴨母樹、鴨母冇、鴨腳木

科　名：五加科(Araliaceae)

學　名：*Schefflera octophylla* Lour. et Harms

生育特徵：半灌性喬木，掌狀複葉，葉片長橢圓形，花頂生，圓錐花序為小繖形花序所組成，花瓣 5。果為核果，球形。

繁殖方法：扦插法繁殖。

利用部位：根皮、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：葉治酒病、風濕脾痛、洗爛腳、敷跌打、祛風。樹皮治班痧毒，木材抗癌。

產　地：台灣野生、新竹。

編　號：452

疔仔草

別　名：羊蹄仔草、羊蹄
土大黃、牛舌大黃
殼菜頭。

科　名：蓼科(Polygonaceae)

學　名：*Rumex crispus* Linn.

生育特徵：多年生草本，莖直，葉互生，根生葉長柄，卵狀長橢圓形，莖生葉卵狀披針形，花小，淡綠色，果卵形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根清熱、通便、利水、止血、殺蟲。

產　地：台灣山野地區、新竹。

藎草

編　號：453

科　名：禾本科
Gramineae (Poaceae)

學　名：*Arthraxon hispidus* (Thunberg.) Makino

生育特徵：習生於山坡草地。多年生草本，葉長線形、線形。花頂生，腋生，穗狀花序，白色花，瘦果。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草：味苦、性平。有止咳定喘、解毒殺蟲之效。治久咳氣喘、肝炎、咽喉炎、口腔炎、鼻炎、淋巴結炎、乳腺炎、瘡瘍疥癬。

產　地：台灣、新竹。

紅蓖麻

編　號：454

別　名：蓖麻、蓖麻子
紅肚蓖、紅茶蓖。

科　名：大戟科(Eupforbiaceae)

學　名：*Ricinus communis* Linn

生育特徵：多年生灌木，葉掌狀分裂，裂片廣披針形，莖紅色。花頂生，腋生，開白色花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉及種子。

主要成分：含精油。

功　效：種子消腫拔毒，瀉下通滯。治癰疽腫毒、瘰癧、喉痺、疥癩癬瘡、水腫腹滿、大便燥結。種子油治大便燥結、瘡疥、燒傷。根鎮靜解痙、祛風散瘀。治破傷風、癲癇、風濕疼痛、跌打瘀痛、瘰癧、葉治腳氣、陰囊腫痛、咳嗽痰喘、鵝掌風、瘡癤。蓖麻子及蓖麻油孕婦及便滑者忌服。

產　地：台灣、新竹。

桃金娘

編　號：455

別　名：多年頭、水刀蓮、哆哖仔刀宜頭、山稔子、崗稔

科　名：桃金娘科(Myrtaceae)

學　名：*Rhodomyrtus tomentosa* Hassk

生育特徵：多年生灌木，葉橢圓形、廣卵形。花腋生，開白花紅色花，結蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、果、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：全年採其幹，切片，晒乾，祛風、止瀉。主治風濕關節炎、神經痛、打傷、白濁、痢疾。

產　地：台灣野生、新竹。

駁骨草

編　號：456

別　名：駁骨丹

科　名：爵床科(Acanthaceae)

學　名：*Justicia gendarussa* Burm. f.

生育特徵：多年生灌木，葉互生，呈條線形、線形。莖節隆起。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：枝葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採枝葉為跌打損傷藥。治關節炎、風邪。

產　地：台灣、新竹。

編　號：457

雨傘草

別　名：雨傘仔
科　名：紫金牛科(Myrsinaceae)
學　名：*Ardisia cornudentata* Mey
生育特徵：多年生草本。葉倒長橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根袪瘀活血。
產　地：台灣、新竹。

編　號：458

九節木

別　名：山大刀、牛屎烏
青龍吐霧、烏無常
厚肉仔
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Psychotria rubra* (Lour.) Poil
生育特徵：多年生灌木，葉呈橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根、葉為治跌打要藥，解消熱去濕、薰洗痔瘡。為良好的清熱解毒、治喉痛、腸傷寒、接骨生肌。
產　地：華南、台灣、日本、新竹。

編　　號：459

饅頭果

別　　名：面頭果、細葉面頭果
　　　　　細葉赤血仔
科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　　名：*Glochidion rubrum* Bl
生育特徵：多年生灌木或小喬木，葉大形橢圓狀葉。花腋生，開白花，結漿果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：葉、樹皮。
主要成分：生物鹼。
功　　效：葉治僂痲質斯、神經痛，水煎服。山胞以樹皮煎服治腹痛。枝葉水煮，殺菌、腸炎、下痢，經藥理實驗有效。
產　　地：大陸、台灣、新竹。

編　　號：460

裏白懸鉤子

別　　名：深山懸鉤子
科　　名：薔薇科(Rosaceae)
學　　名：*Rubus mesogaeus* Focke
生育特徵：蔓性小灌木，幼莖具柔毛，蔓延莖則無毛具鉤刺。葉互生，3-5出複葉，末端小葉微菱形，側生小葉歪卵形或微菱形，較小，葉尖銳形或短銳尖形，葉基部楔形或圓形，葉緣為重鋸齒緣。葉面光滑，葉背密生白色柔毛，葉軸上有溝，具柔毛及鉤刺。托葉線形至披針形。內光滑，外具柔毛。聚繖花序，腋生或頂生，花白色，果球形。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：果實可食用，莖祛風、除濕。葉治黃水瘡、狗咬傷。根治風濕關節痛、吐血、目中流淚、腎虛陽痿、月經不調。
產　　地：原產於台灣中部地區。

淡竹葉

編　號：461
別　名：竹葉麥冬、山雞米
金竹葉、碎骨子。
科　名：禾本科(Gramineae)
學　名：*Lophatherum gracile* Brongn
生育特徵：多年生草本，葉披針形。
繁殖方法：分枝法繁殖。
利用部位：全草、根莖。
主要成分：含三萜化合物，即白茅素，蘆竹素，蒲公英賽醇，氨基酸，有機酸，糖類。
功　效：可清心火、除煩燥、利尿。其根治尿血、腎火過旺、心煩口渴。全株治熱淋、心臟缺氧、尿毒、中暑、小便作痛。
產　地：台灣、新竹

台灣鯽魚膽

編　號：462
別　名：台灣山桔花
科　名：紫金牛科(Myrsinaceae)
學　名：*Maesa tenera* Mez
生育特徵：多年生灌木。葉互生，倒橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根治赤痢、胃病。
產　地：台灣、新竹。

編　　號：463

瓜馥木

別　　名：毛瓜馥木
科　　名：番荔枝科(Annonaceae)
學　　名：*Fissistigma oldhamii* Merr
生育特徵：多年生喬木，葉呈十字型葉。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：根莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：為治疳積、小兒百病、筋骨萎縮。
產　　地：華南、台灣。

編　　號：464

山油麻

別　　名：山黃麻、山羊麻
山亞麻、山王麻
科　　名：榆科(Ulmaceae)
學　　名：*Trema orientalis* (L.) Bl.
生育特徵：多年生灌木，葉互生，呈橢圓形、廣卵形。花頂生，腋生，開黃色花，蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根止痛、止血。治腹痛、血尿。
產　　地：台灣、新竹。

硃砂根

編　　號：465
別　　名：鐵雨傘、雨傘子、平地木
科　　名：紫金牛科(Myrsinaceae)
學　　名：*Ardisia crenata* Sims
生育特徵：多年生灌木，葉橢圓狀披針形至倒披針形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：根可解毒消熱、止痛散瘀、治咽喉腫痛、風濕骨節痛、上呼吸道感染、扁桃體炎、白喉、丹毒、淋巴結炎、能抗菌消炎退熱、留火(絲蟲病引起的淋巴管炎)、肺病及勞傷吐血、跌打損傷、關節風痛、婦女白帶、痛經。
產　　地：大陸、日本、台灣、新竹。

臭牡丹

編　　號：466
別　　名：海洲常山、臭芙蓉
芙蓉根、八角梧桐
秋葉、地梧桐、泡花桐
臭梧桐、臭木、臭珠桐
臭燈桐。
科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　　名：*Clerodendrum trichotomum* Thunb.
生育特徵：多年生灌木，葉卵形、圓形、廣卵形。花腋生，穗狀花序，白色花。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：枝葉、根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採葉及梗治高血壓。
產　　地：台灣、大陸、韓、日本。

編　號：467

水金京

別　名：水金驚、水魂仔
水金定
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Wendlandia formosana* Cow.
生育特徵：多年生草本，葉卵形、圓形、橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採葉及根搗汁治創傷。
產　地：台灣、華南、日本。

編　號：468

紅莧草

別　名：紅木耳、紅靛、一口紅
一品紅、漢宮秋、酒丹參
血莧、紅葉莧、洋莧圓葉洋莧
科　名：莧科（Amaranthaceae）
學　名：*Iresine herbstii* Hook.f.
生育特徵：多年生草本，高 50-150cm，枝葉紫紅色，葉互生，葉片闊卵形或近圓形，長 2-5cm，寬 2-4cm，紅色至紫紅色。穗狀花序，頂生或腋生，多數呈圓錐花序，花小，白色或淡黃色，胞果。花果期秋冬間。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草有涼血、止血、清熱、解毒、調經之效。治吐血、咳血、衄血、便血、血崩、創傷出血、月經不調、痛經、腸炎、痢疾。
產　地：巴西、中國大陸福建、廣東、廣西、雲南等地及台灣。

編　號：469

雞屎樹

別　名：生毛將軍、山白菜
見雙黃、紅根白毛倒提壺
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Blumea lacera* (Burmann F.) De Candolle
生育特徵：多年生灌木，習生於路旁、草地。葉橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草味苦、性寒、有清熱瀉火、解毒消腫之效。治肺癰、肺炎、肝炎、咽喉腫痛、口舌生瘡、牙齦膿腫、腮腺炎、癰腫瘡毒、頭痛、咳嗽。
產　地：台灣野生、新竹。

編　號：470

山素英

別　名：山秀英、山回英、秀英花根
賜客花藤、素茶花
白茉莉、山四應、白蘇英
科　名：木犀科(Oleaceae)
學　名：*Jasminum hemsleyi* Yamamoro
生育特徵：多年生蔓性草本，葉橢圓形、披針形。花自腋生，開白花，結漿果，熟時黑色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草連根掘起，有行血補腎，理帶明目之功。主治眼疾、腰痠。
產　地：台灣、新竹。

編　　號：471

大葉十大功勞

別　　名：鐵八卦、山黃柏
黃心樹
科　　名：小蘗科(Berberidaceae)
學　　名：*Mahonia japonica* DC.
生育特徵：多年生灌木，葉波形隆狀突，邊緣鋸齒。花腋生，成穗狀花序，開淺黃色花，結漿果，熟時藍色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉、根莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全年採葉為清涼滋養。
產　　地：大陸、日本、台灣、新竹

編　　號：472

紅莖空心菜

別　　名：蕹菜、應菜、甕菜
科　　名：旋花科(Convolvulaceae)
學　　名：*Ipomoea reptans* Poir
生育特徵：多年生草本，莖中空，紅色，葉廣披針形。花腋生，長管狀，開白花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全株味甘、性平、解毒。搗汁和酒服治難產。草治跌打損傷，搗敷蛇傷、搗汁內服。
產　　地：大陸、台灣、新竹。

排香草

編　　號：473
別　　名：香排草、細梗香草
　　　　　靈香草
科　　名：報春花科(primlaceae)
學　　名：*Lysimachia capillipes* Hemsl
生育特徵：多年生草本。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草治虛弱、氣管炎、哮喘、月經不調、感冒、咳喘、風濕痛、益氣補虛、祛風活血。
產　　地：台灣、新竹

白花馬鞍藤

編　　號：474
別　　名：白馬鞍藤、厚葉牽牛
　　　　　裂葉小鸞藤。
科　　名：旋花科(Convolvulaceae)
學　　名：*Ipomoea stolonifera* Poir.
生育特徵：多年生藤本，葉呈馬鞍形。花自腋生，開白色花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草治下消、赤白帶、神經痛、夢洩。
產　　地：華南、台灣、新竹。

血木

編　　號：475

別　　名：紫衫、赤柏松、朱樹

科　　名：紫衫科(Taxaceae)

學　　名：*Taxus cuspidata* S. et Z.

生育特徵：多年生喬木，葉呈羽狀複葉，小葉呈針狀形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：含紫杉素、紫杉鹼（taxine）

功　　效：木材、枝、葉及皮含紫杉素，治糖尿病。葉對馬牛有毒，葉含紫杉鹼（taxine），可降低血壓，心臟運動緩慢，大量則心跳停止。在日本，葉利尿、通經。

產　　地：吉林、日、韓等地、台灣、新竹。

黃金桂

編　　號：476

別　　名：香港拓樹、大丁黃癀
刺格仔、刺果、拓果
穿破石、凹頭畏芝

科　　名：桑科(Moraceae)

學　　名：*Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masamune var *gerontogea* (S.et Z .) kudo et Masumune

生育特徵：多年生灌木，葉橢圓形。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根、幹。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根、莖為治跌打損傷之良藥。亦為風濕關節藥。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：477

萬點金

別　名：燈秤仔、燈稱花、烏雞骨
燈秤花、岡梅根、白甘草
檀樓星
科　名：冬青科(Aguifoliaceae)
學　名：*Ilex asprella* (Hook. et Arn.) Champ
生育特徵：自生於台灣山野之落葉灌木，高 4m，根粗如人腿，外被白斑，幹綠色，光滑。葉短柄卵形，3 月-5 月開小白花，腋生，6 月結實，核果橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：根味甘，清熱散毒，煎涼茶多用之。殺疥蟲、跌打損傷。葉治淋病、腫毒、敷毒蛇傷、肺癰、風痛。
產　地：中國東南各省、菲國等地、台灣、新竹。

編　號：478

紅骨蛇

別　名：南五味子、香蘇、紅鈴子
華中五味子、內風消。
科　名：木蘭科(Magnoliaceae)
學　名：*Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils.
生育特徵：多年生落葉木質藤本，葉呈橢圓形、倒卵形、卵狀披針形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、藤。
主要成分：種子含五味子甲素 A (schisandrinA),五味子酯甲、乙、丙、丁、戊(schisantherinA.B.C.D.E.)等。
功　效：果治收斂、滋補生津、止瀉。用於肺虛咳嗽、津枯口渴、自汗、盜汗、慢性腹瀉。
產　地：台灣、新竹

編　　號：479

胭脂花

別　　名：胭脂樹
科　　名：胭脂樹科(Bixaceae)
學　　名：*Bixa orellana* L.
生育特徵：多年生喬木，葉卵形、橢圓形。花腋生，開淺黃色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：種子、根皮。
主要成分：生物鹼。
功　　效：種子為收斂、解熱劑。根皮治瘧。
產　　地：南美、台灣栽培。

編　　號：480

小本山羊桃

別　　名：山羊桃、台灣羊桃
科　　名：彌猴桃科(Actinidiaceae)
學　　名：*Actinidia chinensis* var *setosa* Li.
生育特徵：多年生藤本。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：藤。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採藤強心利尿、治腦神經衰弱、失眠。
產　　地：台灣、新竹。



編　　號：481

紅雀珊瑚

別　　名：洋珊瑚、玉帶根
　　　　　珊瑚枝
科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　　名：*Pedilanthus tithymaloides*(L.)
生育特徵：多年生半直立亞灌木，葉卵形或卵狀矩圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：含黃酮甙，酚類，胺基酸。
功　　效：全草治瘡瘍腫痛、外傷出血、目赤腫痛。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：482

黃楊

別　　名：台灣黃楊、萬年青
　　　　　姬黃楊、石柳
科　　名：黃楊科(Buxaceae)
學　　名：*Buxus microphylla* Sieb. & Zucc.var.*intermedia*(kaneh.) Li
生育特徵：多年生灌木，葉呈橢圓形。花腋生，開白花，結漿果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：莖枝、根、嫩葉、果實。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採樹皮解熱。祛風濕、理氣、止痛。治風濕疼痛、胸腹氣脹、牙痛、疝痛、跌打損傷、活筋骨疼痛、目赤腫痛。
產　　地：中國、琉球、台灣、新竹。



編　號：483

黃花馬櫻丹

別　名：臭金鳳、馬櫻丹
　　　　五龍蘭、紅花刺

科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Lantana camara* L.
生育特徵：多年生灌木，葉隆起卵形、橢圓形。花自腋生，開黃色花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：根解熱、敷蛇傷、瘀腫。煎水洗濕毒疥癩，有關毒病，將葉搗爛，取自然汁，用雙蒸酒沖服，能去其毒；如將葉搗爛加紅糖，冰片少許敷於核上不時轉換，即可清涼止痛。又可治風濕病。且其根治漏精、骨節軟弱。
產　地：華南、台灣、新竹。

編　號：484

黃金色馬櫻丹

別　名：臭金鳳、馬櫻丹
　　　　五龍蘭、紅花刺

科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Lantana mista* Bailey
生育特徵：多年生灌木，葉隆起卵形、橢圓形。花自腋生，開黃金色花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、葉、花。
主要成分：生物鹼。
功　效：根味苦、性寒。有清熱瀉炎，解毒散結之效。治感冒發熱、傷暑頭痛、胃火牙痛、咽喉炎、腮腺炎、風濕痺痛、瘰瀝、痰咳。葉：味辛、苦`、性涼、有清熱解毒，祛風止癢之效。治癰瘡腫毒，濕疹疥癬，皮膚炎，跌打損傷。花味苦、微甘、性涼、有毒。有清熱、止血之效。治肺癆咯血、腹痛吐瀉、濕疹、陰癢。
產　地：台灣、新竹。

編　號：485

粉紅色馬櫻丹

別　名：臭金鳳、馬櫻丹
　　　五龍蘭、紅花刺
科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Lantana camara* L.
生育特徵：多年生灌木，葉隆起卵形、橢圓形。花自腋生，開粉紅色花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、葉、花。
主要成分：生物鹼。
功　效：根味苦，性寒.有清熱瀉炎，解毒散結之效。治感冒發熱、傷暑頭痛、胃火牙痛、咽喉炎、腮腺炎、風濕痺痛、瘰瀝、痰咳。葉味辛、苦、性涼、有清熱解毒、祛風止癢之效。治癰瘡、濕毒、濕疹疥癬、皮膚炎、跌打損傷。花：味苦、微甘、性涼、有毒。有清熱、止血之效。治肺癆咯血、腹痛吐瀉、濕疹、陰癢。
產　地：台灣、新竹。

編　號：486

桔黃色馬櫻丹

別　名：臭金鳳、馬櫻丹
　　　五龍蘭、紅花刺
科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Lantana camara* L.
生育特徵：多年生灌木，葉隆起卵形、橢圓形。花自腋生，開桔黃色花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、葉、花。
主要成分：生物鹼。
功　效：根味苦、性寒。有清熱瀉炎、解毒散結之效。治感冒發熱、傷暑頭痛、胃火牙痛、咽喉炎、腮腺炎、風濕痺痛、瘰瀝、痰咳。葉：味辛、苦、性涼、有清熱解毒、祛風止癢之效。治癰瘡腫毒、濕疹疥癬、皮膚炎、跌打損傷。花：味苦、微甘、性涼、有毒。有清熱、止血之效、治肺癆咯血、腹痛吐瀉、濕疹、陰癢。
產　地：台灣、新竹。

編　號：487

紫色馬櫻丹

別　　名：臭金鳳、馬櫻丹
五龍蘭、紅花刺。

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Lantana involucrata* Linn.

生育特徵：多年生灌木，葉隆起卵形、橢圓形。花自腋生，開紫色花，結蒴果。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根、葉、花。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根味苦、性寒、有清熱瀉炎、解毒散結之效。治感冒發熱、傷暑頭痛、胃火牙痛、咽喉炎、腮腺炎、風濕痺痛、瘰瀝、痰咳。葉：味辛、苦、性涼、有清熱解毒、祛風止癢之效。治癰瘡腫毒、濕疹疥癬、皮膚炎、跌打損傷。花：味苦、微甘、性涼、有毒、有清熱、止血之效。治肺癆咯血、腹痛吐瀉、濕疹、陰癢。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：488

紫珠（小葉千斤拔）

別　　名：女兒茶

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Callicarpa japonica* Thunb

生育特徵：多年生草本，葉呈橢圓形、廣卵形。花自腋生，開淺紫色花，結漿果，熟時轉紫色。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：嫩葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：嫩葉為茶之代用品，可治眼疾。

產　　地：華東、東北、台灣、韓、日。

編　號：489

山腳破

別　名：三腳破、虱母、虱母頭
虱母草、紅花虱母子
紅花虱母球、梵天花、野棉花
科　名：錦葵科(Malvaceae)
學　名：*Urena lobata* L
生育特徵：多年生草本，葉卵形至橢圓形、圓形。花腋生，開紅花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：全年採全草，為消炎、解毒、能散血凝及散風毒。治慢性盲腸炎、梅毒性疥瘡疳、亦治牙痛、痢疾、酒感、經風、高血壓、慢性胃病等。
產　地：台灣、新竹。

編　號：490

毛地黃

別　名：狹葉毛地黃、毒藥草
洋地黃
科　名：玄參科(Scrophulariaeae)
學　名：*Digitalis lanata* Ehrh
生育特徵：多年生草本，葉呈橢圓形、長橢圓形、披針形。花頂生，無限花序，有紅色、白色、紫色等，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：主成分為 digoxin 及 lanatoside。
功　效：葉為聞名全世界之強心利尿劑，現為提煉該兩種強心配醣體之原料。
產　地：歐洲、台灣清境農場栽培。



金午時花

編　　號：491

別　　名：細葉金午時花、蛇總管
　　　　　黃花稔、嗽血仔草

科　　名：錦葵科(Malvaceae)

學　　名：*Sida acuta Burm*.f.

生育特徵：多年生草本，葉呈橢圓形，花腋生，開黃金色花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草搗敷消炎、解毒、治癰瘡、疔毒。根治胃病。

產　　地：台灣、新竹。

海南島蘄艾

編　　號：492

別　　名：蘄艾、芙蓉、芙蓉菊

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Crossostephium chinense* (L.)Makino

生育特徵：多年生草本，葉互生，緊聚於枝頂，狹倒卵狀楔形，密披灰白色短柔毛。頭狀花序，近球形，生於上部葉腋內，具柄，成一頂生，具葉的總狀花序。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，祛風除濕、固肺、轉骨、解毒。主治風濕、跌打、肺病、下消、小兒發育不良。

產　　地：台灣、新竹。

編 號：493

雪裡青

別 名：金瘡小草、紅白尾蜈蚣
矮金瘡草

科 名：唇形科(Labiatae)

學 名：*Ajuga pygmaea*A.Gray

生育特徵：多年生草本，葉呈圓形、卵形，花腋生，開金黃花，唇形，結莢果。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功 效：葉為收斂劑，治金瘡及刺傷。

產 地：華南、台灣、日本、韓國、琉球等。

編 號：494

韭菜

別 名：韭、起陽草、男人菜
長生韭、壯陽草

科 名：百合科(Liliaceae)

學 名：*Allium tuberosum* Rottl.

生育特徵：多年生草本，葉條形。花自葉基部抽出花梗，開白色花，結蒴果。

繁殖方法：分枝法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功 效：種子治泌尿器疾病。鱗莖治白濁。莖止吐血、衄血。根搗汁塗膝瘡。

產 地：中國、台灣、新竹。

編　號：495

紅花龍船花

別　　名：龍船花
科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　　名：*Clerodendrum paniculataum* L
生育特徵：多年生灌木，葉大，卵形至橢圓形。花頂生，腋生，穗狀花序，開紅色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：根、幹、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根及幹，代白龍船花用，為調經理帶、治月經不調、赤白帶、腎虧、下消、淋病。葉敷腫毒。
產　　地：華南、台灣、中南半島。

編　號：496

山芹菜

別　　名：細本山芹菜、水斳水芹菜、野芹菜。
科　　名：繖形科(Umbelliferae)
學　　名：*Oenanthe javanica* (Bl) DC.
生育特徵：一年生草本，葉掌狀分裂，裂片橢圓形。花頂生，腋生，開淺白色花，繖形花序，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含精油。
功　　效：全年採全草，野菜用、可解熱、潤肺、治高血壓。莖葉為強壯劑，葉含精油。
產　　地：台灣北部、中部、太平山及中國等地。

編　　號：497

香菇草



別　　名：金錢草、連錢草、透骨消
科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Glechoma hederacea* L.
生育特徵：多年生草本，葉圓形，蔓性，葉如一片一片速接起來，連錢。又如香菇形，花腋生，白色，唇形花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含精油、麥胚固醇（Sitosterol）、鞣質、膽鹼。
功　　效：採全草治女子月經時腰腹刺痛、陰冷、血崩、吐血、便血、牙痛、骨痛、散風濕、治跌打傷、膀胱結石特效。
產　　地：華中、日本、台灣、新竹。

編　　號：498

樹香茄

別　　名：香茄
科　　名：茄科(Solanaceae)
學　　名：*Cyphomandra betacea* Seudt
生育特徵：多年生灌木，葉呈橢圓形、卵形，花腋生，開紫白色花，果為漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果。
主要成分：生物鹼。
功　　效：果為清涼退火，亦可當水果用，觀賞。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：499

台灣洛神花

別　　名：洛神花、洛神葵
山茄、洛濟葵

科　　名：錦葵科(Malvaceae)

學　　名：*Hibiscus sabdariffa* L.

生育特徵：一年生灌木，葉掌狀分裂，裂片橢圓形。花頂生，腋生，開紅色花，結漿果，熟時紅色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、花萼、花冠及種子。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根為強壯劑，花為清涼飲料，種子為緩下、利尿、強壯劑。花對腸子及子宮筋具抗痙攣作用，降血壓，驅蟲。

產　　地：印度、台灣栽培。

編　　號：500

竹葉草

別　　名：竹節草、竹仔菜
白竹仔菜、竹仔葉

科　　名：鴨跖草科
(Commelinaceae)

學　　名：*Commelina diffasa* Barm.f.

生育特徵：多年生草本，匍匐性，葉呈長橢圓形，花頂生，腋生，開白色花，結蒴果。

繁殖方法：扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草理白濁、清熱、散毒、利小便。其根莖敷瘡癤。葉敷腫毒、跌打。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：501

異葉左手香

別　名：左手香、到手香
印度薄荷
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Plectranthus amboinicus* (Lour) Spreng
生育特徵：多年生草本，揉之有香氣，莖粗壯，密被灰白色長柔毛，葉對生，葉形不同，闊卵形或卵狀橢圓形，下部的葉較小，尖端鈍尖，基部闊楔形或近心形，邊緣具不整齊的鈍鋸齒，兩面均被灰白色短柔毛，輪繖花序密集成穗狀，頂生或腋生，花冠唇形，淡紫紅色，小堅果橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草為消炎、解毒、消腫。
產　地：印度、台灣。

編　號：502

琉璃草

別　名：瑠璃草、瑠璃飛燕草
科　名：毛茛科(Ranunculaceae)
學　名：*Delphinium consolida* L.
生育特徵：一年生草本，葉掌狀分裂，裂片披針形，花頂生，腋生，開黃花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：採種子殺髮蝨寄生蟲，亦治痙攣性哮喘及水腫。
產　地：歐洲、台灣栽培。

編　　號：503

牛頓草

別　　名：牛筋草、牛頓棕
蟋蟀草、魚鰭草
萬斤草

科　　名：禾本科(Gramineae)

學　　名：*Eleusine indica* (L.) Gaertn.

生育特徵：多年生草本，葉條形、線形。花頂生，穗狀花序。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草為發汗、解熱劑。治肝病、糖尿病。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：504

大葉車前草

科　　名：車前草科(Plantaginaceae)

學　　名：*Plantago major* Linn

生育特徵：多年生草本，葉互生，呈披針形、廣披針形，葉大。花自基部抽出，穗狀花序，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草利尿、鎮咳。種子利尿、鎮咳、祛痰、止瀉、明目、治淋病、咳嗽、眼疾。

產　　地：台灣、新竹、印尼。

蝴蠅翅

編　號：505

別　名：三點金草、蠅翅草
萹蓄、珠仔草、三耳草
四季春

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Desmodium triflorum* (L.) DC.

生育特徵：多年生草本，匍匐性。葉三出葉，小葉圓形、橢圓形。花腋生，白花，結莢果。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草煎服，去風、解熱、治疥癬癢、黃疸、淋病、小兒咳嗽。鮮葉治創傷及膿腫不收口。

產　地：台灣、新竹。



小萹蓄

編　號：506

別　名：假萹蓄、台灣萹蓄
節花路蓼、珠仔蓼、腋花蓼

科　名：蓼科(Polygonaceae)

學　名：*Polygonum plebeium* R. Br.

生育特徵：一年生或越年生小草本，高 10-25 cm，全株無毛。葉互生，無柄，光滑倒披針形或狹長橢圓形，圓頭或稍尖，主脈明顯，幾無側脈。花粉紅色或白色，雄 5，瘦果，稜三角形，黑色，有光澤。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草去風解熱、治黃疸、淋病。

產　地：台灣、新竹。



石竹（鮮紅）

編　　號：507
別　　名：剪絨花、瞿麥、巨麥草、巨麥、具麥
科　　名：石竹科(Caryophyllaceae)
學　　名：*Dianthus chinensis* L.
生育特徵：多年生草本，葉互生，呈條形。花頂生，腋生，開鮮紅色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草為利尿劑，治水腫及淋病，對血淋有特效又可通經。種子末治淋病。觀賞、佈置用。
產　　地：台灣、新竹。

石竹（紅）

編　　號：508
別　　名：姬石竹
科　　名：石竹科(Caryophyllaceae)
學　　名：*Dianthus doltoides*
生育特徵：多年生草本，葉互生，呈條形。花頂生，腋生，開紅色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全株有抑制腫瘤功效。觀賞佈置用。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：509

石竹（粉紅）

別　名：修道石竹
科　名：石竹科(aryophyllaceae)
學　名：*Dianthus carthusianorum*
生育特徵：多年生草本，具有密集成叢的禾草狀葉，鮮粉紅色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草有抑制腫瘤功效。觀賞佈置用。
產　地：台灣、新竹。

編　號：510

石竹（白邊紅圍）

別　名：五彩石竹
科　名：石竹科(Caryophyllaceae)
學　名：*Dianthus chinensis*
生育特徵：多年生草本，開白邊紅色圍之花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：具抑制腫瘤功效。觀賞佈置用。
產　地：台灣、新竹。

編　號：511

石竹（橘紅）

別　　名：羽花石竹
科　　名：石竹科(Caryophyllaceae)
學　　名：*Dianthus plumarius.*
生育特徵：多年生草本，是許多古典石竹的母體，開桔紅色花。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：具抑制腫瘤功效。觀賞佈置用。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：512

石竹（斑點紅圍）

別　　名：五彩石竹
科　　名：石竹科(Caryophyllaceae)
學　　名：*Dianthus chinensis*
生育特徵：多年生草本，為斑點紅圍之花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：具抑制腫瘤功效，觀賞佈置用。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：513

錦葉蝴蝶

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Caesalpinia pulcherrima* Linn

生育特徵：一年生或越年生草本，葉呈錦色，對生，葉似蝴蝶形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：消炎、退火等有效。

產　地：台灣、新竹。

編　號：514

石蓮

別　名：石蓮花、石蓮華風車草、神明草。

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Graptopetalum paraguayense* (N.E.Br.) E. Walther.

生育特徵：多年生肉質草本，初生單莖葉叢生，漸長則多枝，多臥伏。莖上葉十字對生密集莖端，多柄，葉片肥厚肉質，倒卵狀匙形或菱形，基部漸狹，先端尖，全緣，兩面光滑，被粉白色。花小，鐘狀，乳黃色或橙紅色。

繁殖方法：葉插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草有清熱、利濕、涼血、平肝之效。治高血壓、肝病、感冒、咽喉痛、尿酸、關節疼痛、黑斑、赤白帶。

產　地：墨西哥、台灣、新竹。

編　號：515

石蓮

別　名：石蓮花、石蓮華
風車草、神明草

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Graptopetalum paraguayense* (N.E.Br.) E. Walther.

生育特徵：多年生肉質草本，初生單莖葉叢生，漸長則多枝，葉脫落成長莖，多臥伏。莖上葉十字對生密集莖端，多柄，葉片肥厚肉質，倒卵狀匙形或菱形，基部漸狹，先端尖，全緣，兩面光滑被粉白色，小花梗長 1.5cm，花小，鐘狀乳黃色或橙紅色。

繁殖方法：葉插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草有清熱、利濕、涼血、平肝之效。治高血壓、肝病、感冒、咽喉痛、尿酸、關節疼痛、黑斑、赤白帶。全年可採嫩莖葉，鮮用或曬乾用。

產　地：墨西哥、日本、台灣、新竹。

編　號：516

石蓮

別　名：石蓮花、石蓮華
風車草、神明草

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Graptopetalum paraguayense* (N.E.Br.) E. Walther.

生育特徵：多年生肉質草本，初生單莖葉叢生，漸長則多枝，葉脫落成長莖，多莖上，葉十字對生密集莖端，多柄，葉片肥厚肉質，倒卵狀匙形或菱形，基部漸狹，先端尖，全緣，兩面光滑，被粉白色。花小，鐘狀，乳黃色或橙紅色。

繁殖方法：葉插法繁殖

利用部位：全草

主要成分：生物鹼。

功　效：全草有清熱、利濕、涼血、平肝之效。治高血壓、肝病、感冒、咽喉痛、尿酸、關節疼痛、黑斑、赤白帶。

產　地：墨西哥、日本、台灣、新竹。

編　號：517

石蓮

別　名：石蓮花、石蓮華
風車草、神明草。

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Graptopetalum paraguayense*(N.E.Br.) E. Walther.

生育特徵：多年生肉質草本，初生單莖葉叢生，漸長則多枝，葉脫落成長莖，多臥伏，莖上葉十字對生密集莖端，多柄，葉片肥厚肉質，倒卵狀匙形或菱形，基部漸狹，先端尖，全緣，兩面光滑，被粉白色。花小，鐘狀，乳黃色或橙紅色。

繁殖方法：葉插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草有清熱、利濕、涼血、平肝之效。治高血壓、肝病、感冒、咽喉痛、尿酸、關節疼痛、黑斑、赤白帶。

產　地：墨西哥、日本、台灣、新竹。

編　號：518

孔雀木

別　名：孔雀豆、紅豆
海紅豆

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Adenanthera pavonina* L.

生育特徵：多年生灌木，葉長披針形，色如孔雀。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子、葉。

主要成分：生物鹼

功　效：種子外用，瘡癤化膿，治頭痛。葉煎服，治痛風、尿道出血。

產　地：台灣、新竹。

編　號：519

當歸

別　名：白蘄、山蘄
科　名：繖形科(Umbelliferae)
學　名：*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels
生育特徵：二年生草本，葉 2-3 回羽狀分裂，裂片卵形。小葉三對。花複繖花序，頂生，開白花，雙懸果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：精油。
功　效：根有補血、和血、調經、潤燥、滑腸之功。促進血液循環，四肢寒冷，切創之疼痛及臟燥痛有效。月經困難尤佳。主治月經不調、血虛或血鬱經閉、經行腹痛、崩漏、風濕痺痛、跌打損傷、癰疽腫毒、血虛腸燥、便秘等症。酒炒當歸，活血行瘀力量更大，為婦科要葯。
產　地：四川、湖北、江西、浙江、廣東、雲南等地、台灣、新竹。

編　號：520

紅花玉芙蓉

別　名：五指山蔘、紅花馬寧
野芙蓉、小紅芙蓉、野棉花
科　名：錦葵科(Malvaceae)
學　名：*Abelmoschas sagittifolius* (Kurz) Merr.
生育特徵：多年生亞灌木狀草本，根肥厚倒圓錐狀。葉互生，具長柄，葉多變化為廣卵形或近圓形。當3-5淺裂或深裂，中央一片最大，被毛。花單生葉腋紅色。蒴果卵形或長橢圓形，種子骨形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉、花及種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：根有滋養強壯，清熱解毒、利濕潤腸、拔毒排膿之效。收花葉外用治癰瘡腫毒。種子治耳聾、水腫、便秘、乳汁不足。
產　地：廣西、廣東、桂州、雲南及東南亞地區、台灣、新竹。

編　號：521

芍藥

科　名：毛茛科(Ranunculaceae)

學　名：*Paeonia lactiflora* Pallas.

生育特徵：二年生灌木，葉 2-3 回羽狀分裂，裂片橢圓形。花腋生，開紅色花，結蓇果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：性微寒味苦酸，柔肝止痛、養血斂陰、利小便。為鎮痙、鎮痛、通經藥。主治腹痛、消散惡血、癰腫、目赤。

產　地：河南、河北、山東、山西、陝西、東北、四川、雲南、浙江、貴州、湖南、湖北、甘肅等、台灣、新竹。

編　號：522

美葉火桐木

別　名：火筒樹、番婆灣

科　名：葡萄科(Vitaceae)

學　名：*Leea guineensis* G Don.

生育特徵：多年生喬木，葉廣卵形。花頂生，腋生，開紅花，核果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：根、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根、葉。根有清熱除濕，收斂之效。治風濕痹痛。葉有解毒、消腫、生肌之效。外用治瘡瘍腫毒。

產　地：台灣、新竹。

編　號：523

橡牙樹

別　名：象牙樹、黑檀
科　名：柿樹科(Ebenaceae)
學　名：*Diospyros ferrea* (Willdenow) Bokhuizen
生育特徵：多年生喬木，葉呈卵形、廣卵形。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：根、莖。
主要成分：生物鹼。
功　效：其樹形優美可當觀賞，且具有抑制癌細胞生長，為抗癌藥。
產　地：蘭嶼、台灣、新竹。

編　號：524

一條龍

別　名：川防風、防風
科　名：繖形科(Umbelliferae)
學　名：*Ligusticum brachylobum* Franch.
生育特徵：多年生草本，葉 2-3 回羽狀分裂，裂片橢圓形、披針形。花頂生，腋生，繖形花序，開白花，瘦果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　效：春秋二季採根，味辛甘溫，有發表、祛風、除濕之功。治感冒、牙痛、發熱、無汗、關節痛、四肢拘攣、破傷風等。
產　地：四川、貴州、雲南、台灣、新竹。

編　號：525

軟枝椬梧

別　名：椬梧
科　名：胡頹科(Elaeagnaceae)
學　名：*Elaeagnus oldhamii* Maxim.
生育特徵：多年生喬木，葉橢圓形、廣卵形。花腋生，開白花，結核果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、幹。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根、幹祛風除濕、散瘀血、消腫。治風濕神經痛、久年風傷、月內風、慢脾風、跌打、肺癰。
產　地：台灣、新竹。

編　號：526

裏白巴豆

別　名：廣仔、猛樹、貢仔
落水金光、巴菽、剛仔、老陽子
科　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　名：*Croton tiglium* L.
生育特徵：為常綠小喬木，卵形，先端尖銳，基部心臟形，葉緣呈淺鋸齒狀，長葉柄。花為總狀花序，淡黃白色，瘦果倒卵形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根莖及種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：辛、溫、有毒。主治傷溫虐寒熱、堅積留飲、開道閉塞、利水穀道、殺蟲魚、療女子月閉爛胎、金瘡膿血不利、水腫、除風補勞、健脾開胃、排膿消腫毒。種子可製巴豆油。為猛瀉藥、有行血、止痛之效。並為跌打、胃痛、腹痛、蛇傷等，全年採根、枝幹，稱落水金光，治腹痛、蛇傷。
產　地：台灣及中國大陸、馬來西亞、東印度等地。

小本扛板歸

編　　號：527
別　　名：扛板歸、犁壁刺
犁壁藤、三角鹽酸
科　　名：蓼科(Polygonaceae)
學　　名：*Polygonum perfoliatum* L.
生育特徵：多年生草本，匍匐性，葉呈犁壁形，全棵有刺。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：葉片小，莖蔓、葉及葉柄均有刺。採全草止痢、降血壓、洗膚癢、敷腫毒、蛇傷。
產　　地：台灣山野地區。



立枝紅乳草

編　　號：528
別　　名：紅乳仔草、小飛揚草
乳仔草
科　　名：大戟科(Eupforbiaceae)
學　　名：*Euphorbia thymifolia* Linn.
生育特徵：一年生草本，葉小卵形、橢圓形、圓形。全株莖、葉紅色，立枝，莖含白色汁液，花腋生，開白花，蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草治痢疾、腸炎。葉敷蛇傷。
產　　地：台灣山野地區。

圓葉白蓮蕉

編　　號：529
別　　名：白花蓮蕉
科　　名：曇華科（美人蕉科）
Cannaceae
學　　名：*Camna indica* Linn.
生育特徵：多年生草本，葉呈圓形葉，互生，由基部抽出花梗，開白花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、塊根繁殖。
利用部位：根莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：根莖稱白花蓮蕉頭，消腫、清熱、治淋巴行腫瘤。葉治高血壓，全草搗敷腫毒。
產　　地：台灣山野地區。

紅背鴨跖草

編　　號：530
別　　名：紫錦草、紅葉鴨跖草
科　　名：鴨跖草科
(Conmelinaceae)
學　　名：*Setcreasea purpurea* Boon.
生育特徵：多年生草本，葉呈長橢圓形，葉背紅色。花由腋生，紅色花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草治肝炎、肺炎、吐血、瘀血、丹毒、疔瘡、腫毒、火傷。
產　　地：台灣各地。

編　　號：531

斑葉莎草

別　　名：莎草、香附、土香
科　　名：莎草科(Cyperuaceae)
學　　名：*Cyperus rotundus* L.
生育特徵：多年生草本，葉條形，輪生。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草主要為理氣、解鬱、調經、止痛、抗癌。
產　　地：亞洲各地

編　　號：532

白花野牡丹

別　　名：野牡丹、王不留行
金石榴、白埔筆仔
地茄、白不留行
白九螺花。
科　　名：野牡丹科(Melastomataceae)
學　　名：*Melastoma candidum* D.Don
生育特徵：多年生草本，葉橢圓形。花腋生，開白花，漿果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根、莖、花、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根及幹為風濕肺癰，傷科良藥，葉治胃病。花：治糖尿病。
產　　地：華南、台灣。

腹水草

編　號：533
別　名：田香草
科　名：玄參科(Scrophulariaceae
學　名：*Limnophila aromatica* Merr.
生育特徵：多年生草本。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採收莖、葉治婦女頭目眩暈、腹痛。
產　地：南海、台灣、日本。

甜菊

編　號：534
別　名：冰糖菜、甜葉菊糖菊、瑞寶澤蘭
科　名：菊科(compositae)
學　名：*Stevia rebaudiana* Batani
生育特徵：多年生草本，葉呈長橢圓形，花頂生，腋生，開白花，結蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含 stevioside 及 rebaudioside
功　效：採全草為甘味料之原料，為糖尿病患者的甜分食品。
產　地：巴拉圭、台灣、新竹。

編　號：535

剪刀股

別　名：石竹、瞿麥子
剪絨花

科　名：石竹科(Caryophyllaceae)

學　名：*Dianthus chinensis* L.

生育特徵：為多年生草本植物，全株呈粉綠色，莖叢生，直立。高約 30cm。葉對生，線形或披針形，銳尖頭。初夏開紅白各種顏色之花。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：種子。

主要成分：皂素。

功　效：採種子為利尿劑。治水腫及淋病，亦為通經藥。且為庭園供觀賞用。

產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：536

仙鶴草

別　名：水楊梅、地椒、水益母
暈頭菜、路邊香、香雞歸
龍芽草、牛尾草、黃龍尾

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Geum japonicum* Thun

生育特徵：多年生草本，全株密被白色柔毛。根生葉具長柄，葉片羽狀分裂，裂片大小不一，頂裂片特大，卵狀圓形或心形。莖生葉卵形至廣卵形。花黃色。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草有補益虛滋骨、祛風止痛、解毒消腫之效根治腎虛頭痛、風寒感冒、腹痛瀉痢。

產　地：大陸中南部地區、日本、台灣、新竹。

編　號：537

小地榆

別　名：庭院地榆
科　名：薔薇科（Rosaceae）
學　名：*Sanguisorba minor*
生育特徵：多年生草本，根莖肥大匍匐，羽狀複葉，優雅，叢生，莖纖細，上端著生圓球狀，且尖端紅色的綠色花，初夏開放。花微小，花柱紅色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：維他命 C。
功　效：新鮮的葉含維生素C且助消化，可為沙拉、乳酪、湯、魚用醬汁、沙拉調味汁及冷飲增添堅果味。葉的浸出液洗皮膚可治療陽光灼傷及過敏，飲用有利尿，滋補之功效，還可預防蛀牙。
產　地：歐洲、北美、亞洲、台灣、新竹。

編　號：538

木防己

別　名：板南根、青藤
鼓兒藤、青木香
白山蕃薯、防己
科　名：防己科
(Menispermaceae)
學　名：*Cocculus trilobus* D.C.
生育特徵：多年生藤本，葉卵形、圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：莖及根含木防己鹼、類木防己鹼及木防己胺。
功　效：7-8 月採收根治水腫、淋病、僂麻質斯。
產　地：台灣、新竹。

編　　號：539

太陽蓼

別　　名：紅辣蓼
科　　名：蓼科(Polygonaceae)
學　　名：*Polygonum caespitosum* Bl.
生育特徵：一年生草本，高 20-50cm，分枝，圓柱形，呈紅色，葉互生，披針形至狹披針形，長 5-10cm，寬 1-1.5cm，穗狀花序，花紅色，瘦果扁平，圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含蓼酸(Polygonic acid)生物鹼。
功　　效：採全草主治跌打、瘡疥、止癢、消腫、解熱利尿。
產　　地：台灣野生。

編　　號：540

烏芙蓉

別　　名：海芙蓉、石蓯蓉
科　　名：藍雪科(Plumboginaceae)
學　　名：*Limonium sinense* (Girard) ktze.
生育特徵：多年生草本。叶呈倒長橢圓形。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草祛風、治傷、降血壓、風濕病、傷藥、哮喘。
產　　地：台灣海岸地區。

編　號：541

益智

別　名：益智仁

科　名：薑科(Zingiberaceae)

學　名：*Amomum amarum* L.

生育特徵：多年生草本，葉互生，葉呈長披針形。花頂生，開白花，結蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖和塊莖繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：揮發油、樹脂。

功　效：果實益脾胃、溫腎陽。治腎虛滑泄、遺精、胃病。

產　地：東南亞及大陸等地、台灣、新竹。

編　號：542

地黃(台)

別　名：赤矢地黃

科　名：玄參科(Scropbulariaceae)

學　名：*Rehmannia glutinosa* L.var. *lutea* Makino f.purpurea makino.

生育特徵：多年生草本，高 15-30 公分，葉根生，長圓形。夏由地上部抽出長花柄，具小型葉，互生。總狀花序，花冠淡淡紫紅色。蒴果，圓形或卵形。

繁殖方法：實生法繁殖和塊根繁殖。

利用部位：葉、花、果子。

主要成分：含 Catalpol。

功　效：根及根葉供藥用，涼性滋補劑，有潤髮、補血之效。為強壯、解熱藥。含 Catalpol，有降低血糖，緩和瀉下及利尿作用(動物實驗)。

產　地：大陸、韓、日等地、台灣栽培者即是本種。

編　　號：543

問荊

別　　名：木賊、剃髮刷。

科　　名：木賊科(Eguisetaceae)

學　　名：*Eguisetum arvense*

英　　名：(Horsetail)

生育特徵：屬隱花植物，莖有二型，營養莖綠色，生殖莖褐色，頂端生有直立的圓錐形孢子囊，內生孢子。

繁殖方法：孢子繁殖。

利用部位：莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：幼嫩枝頭可煮食，亦可醃成泡菜。莖可止血、收斂、利尿、對泌尿生殖系統疾病，尿床有療效。可調節體內代謝平衡。含豐富礦物質和鹽類。對血液、頭髮和指甲有滋補強化作用。SiO2 的存在促進結締組織的再生，增加其強度和彈性，對關節炎、潰瘍利濕疹有幫助。

產　　地：歐亞大陸、北美洲、台灣、新竹。

編　　號：544

大花野百合

別　　名：黃花野百合、豬屎豆黃野百合、玲瓏仔草。

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Crotalaria pallida* Ait.

生育特徵：一年生，莖叢生有毛，三出複葉，小葉卵形至長橢圓形。開花期 8-12 月，頂生總狀花序，黃花。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：供牧草、觀賞、綠肥。採根治手足無力、散腫毒。

產　　地：全台各地野生。

編　號：545

牛蒡

別　名：惡實

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Arctium lappa* L.

英　名：Edibe burdock.

生育特徵：二年生草本，根生葉叢生，莖生葉互生，葉大，葉片廣卵形或心臟形，在莖上的葉逐漸變小，邊緣稍帶波狀或呈齒牙狀，上深綠色，背密生灰白色短絨毛。頭狀花序叢生，著生於枝端，排列繖房狀。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實、根。

主要成分：含惡實苷（arctin），脂肪油 20-30 %及菊糖。

功　效：採用果實或根，辛、苦、涼。為疏散風熱，宣肺透疹、消腫解毒。利尿解熱，治浮腫及咽喉腫痛、腫脹、肺炎、感冒、猩紅熱、耳下腺炎。滋補、壯陽。

產　地：華北、東北、歐洲、韓、日、台灣、新竹。

編　號：546

丹蔘

別　名：紅根、紫丹參、血山根
血參、大紅袍、赤參、紅丹參
血生根、燒酒壺根、山蘇子根

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Salvia multiorrhiza* Bunge.

生育特徵：丹參為多年生草本，莖直立，四方形，葉對生，奇數羽狀複葉，小葉 3-5 片，卵圓形。花總狀花序，頂生或腋生。花唇形，藍紫色。果實為四個小堅果組成，黑色，橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：根。

主要成分：根含丹參酮甲及乙、丙(tamsinon Ⅰ`Ⅱ`Ⅲ)，Salviol.。

功　效：採根，為活血、去瘀、調經、消腫、止痛、排膿生肌。強壯、通經劑。

產　地：華北、東北、台灣、新竹。

編　　號：547

心基葉溲疏

別　　名：圓八仙花

科　　名：虎耳草科 (saxifragaaceae)

學　　名：*Hydrangea cuspidata* (Thunb.) Mig var *japonica*(sieb) koidzum

生育特徵：多年生常綠灌木，葉對生，葉片卵形、卵狀長橢圓形。花總狀花序，開白花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：清熱利尿、滋腎。

產　　地：中國大陸、台灣、新竹。

編　　號：548

木蓮

別　　名：薜荔、苜蓮、木鐸、木瓜藤、桔杷、膨泡樹、餅泡樹、糖饅頭、文頭果、文頭柳、壁石虎、石壁蓮、風不動、愛玉子

科　　名：桑科(Moraceae)

學　　名：*Ficus pumila* L.

生育特徵：多年生藤蔓草本植物，葉互生，葉片卵形、橢圓形。花隱頭花序，腋生，開白花。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：葉、莖、果。

主要成分：含芸香苷、中肌醇等。

功　　效：(一)枝葉：為激性藥及消腫藥，治惡瘡、癰疽及癬疥。

(二)莖：莖名蔓頭灌、王不留行。通經、行血、治便血、癰疽疳疔。

(三)果：稱鬼球、鬼饅頭。壯陽、固精、止血、下乳。愛玉子為夏季清涼解渴飲料。

產　　地：華南、台灣、日本

編　號：549

白芨

別　名：白及、紫蘭、朱蘭、連及草
甘根、白根、羊角七、紅頭白及

科　名：蘭科(Orchidaceae)

學　名：*Bletilla striata* (Thunb.)Reichb.f.

生育特徵：多年生草本植物，葉長披針形。花頂生，紫色花，結蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：塊莖。

主要成分：含黏液質澱粉、精油。

功　效：8-9 月採塊莖最佳，為膠黏性止血劑。補肺、生肌、祛痰、止血。治吐血、肺病、咳血、胃潰瘍、嘔血等，粉末服有效。外用瘡毒諸瘍。能促進肉芽之發生，其粉末調麻油，塗燙火傷。亦為創傷皮裂之黏合劑。

產　地：中國大陸、台灣、日本。

編　號：550

大金櫻

別　名：金櫻子、大金英
刺梨子、山雞頭子
山石榴、白玉帶、下山虎

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Rosa laevigata* Michx.

生育特徵：多年生常綠蔓性灌木，莖有刺，三初複葉，互生，小葉橢圓狀卵圓形、卵狀披針形。花單生，紅色，瘦果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：果。

主要成分：生物鹼。

功　效：果治遺精、遺尿、小便頻繁、腸炎、久痢、散瘀、活血、解毒、收斂、腎炎、風濕、關節痛、腰肌勞損、月經不調、白帶。

產　地：台灣北中部。

爵床

編　號：551

別　名：鼠尾癀、麥穗癀、嬰兒草

科　名：爵床科(Acanthaceae)

學　名：*Justicia procumbens* Linnaeus.

生育特徵：生平野陰濕地，一年生草本，葉對生，卵形、卵狀披針形。花穗狀花序，頂生，腋生，淡紫白色花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草味苦、鹹、辛、性寒。有清熱解毒、利濕消積、活血止痛之效。治感冒發熱、咳嗽、咽喉腫痛、目赤腫痛、疳積、濕熱瀉痢、黃疸、浮腫、瘧疾、小便淋濁、筋骨疼痛、跌打損傷、癰疽、疔瘡、濕疹。

產　地：台灣、新竹。

金絲桃

編　號：552

科　名：福木科(Guttiferae)

學　名：*Hypericum chinense* L.

生育特徵：係灌木，枝條細長，常旁垂，四稜線，葉對生，幾無柄。葉片橢圓形至長橢圓形或卵狀長橢圓形，全緣，暗綠色。具綠色腺點。花腋生或頂生。鮮黃色。蒴果狹卵形。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：葉、莖枝。

主要成分：生物鹼。

功　效：葉治惡疽、胃痙攣、腫毒等。全年採莖枝，有活血、調經、止痛、消腫。

產　地：中國大陸、日本、台灣、新竹。

錢菖蒲

編　　號：553
別　　名：野燈心草、錢蒲
科　　名：燈心草科(Juncaceae)
學　　名：*Juncus leschenaultii* J. Gayex Laharp
生育特徵：多年生草本，叢生，複聚繖花序，小花成簇，淡綠色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：莖髓或全草充燈心草。清心降火利尿、通淋、治黃疸病、尿道炎。
產　　地：台灣、新竹。

荔枝草

編　　號：554
別　　名：碟仔草、透明草
小葉冷水麻
科　　名：蕁麻科(Urticaceae)
學　　名：*Pilea microphylla*(L.) Liebm
英　　名：Artilery clear weed
生育特徵：一年生草本，肉質，莖透明，多分枝，直立或匍散。葉細小橢圓形，花綠白色，瘦果卵形或長橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採用全草，清熱、解毒、利濕、安胎之效。
產　　地：台灣野生

延命草

編　號：555
別　名：台灣延命草
台灣香茶菜、毛果延命草
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Rabdosia taiwanensis* (Wasamune) Hara.
生育特徵：多年生草本，葉廣卵形、廣披針形。葉對生，花圓錐花序，開淡白紫色花，瘦果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草有起死回生之效。葉貼頭痛。
產　地：台灣自生。

指甲花

編　號：556
別　名：鳳仙花、急性子
科　名：鳳仙科(Balsaminaceae)
學　名：*Impatiens balsamma* L.
生育特徵：一年生或越年生草本，葉橢圓形、披針形。花腋生，開紫花、紅花、白花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：種子治難產積塊噎膈，下骨哽透骨通竅解毒藥，通經催生。治月經困難，月經停止。花清血、治胸痛、蛇傷、毒蟲傷。莖洗腫毒、治風透骨、沖黃酒服治跌打。葉搗敷治指甲傷。亦製指甲油塗指甲。
產　地：台灣、歐洲、中國。

編　號：557

款冬

別　名：咳嗽草
科　名：菊科(compositae)
學　名：*Tussilago farfara*
英　名：Coltsfoot

生育特徵：根莖蔓生，莖上有鱗片，早春開灰黃色花，凋謝後長成叢大葉片。葉下面有白色茸毛，花有甘草氣味，聚生種子。花梗被鱗片，高 30cm。
繁殖方法：實生法繁殖、根莖繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含為他命 C、鋅及生物鹼。
功　效：葉柔軟，含維生素 c 和鋅，可做湯和沙拉，磨成粉末後可作藥煙草，治咳嗽、皮膚潰瘍、痙痛。花曾是法國藥劑師的象徵，治黏膜炎、痙攣和發炎，還可以促進免疫細胞的產生。含少量有毒生物鹼，但以水煮沸後可解。根莖止咳。
產　地：亞洲西部、北部、北美洲、歐洲、台灣、新竹。

編　號：558

竹芋

別　名：粉薯、竹薯、金筍
葛鬱金、結粉、山百合
科　名：竹芋科(Marantaceae)
學　名：*Maranta arundinacea* L.
英　名：Arrow root.

生育特徵：多年生草本植物，葉互生，葉長橢圓形、披針形。花小白色，總狀花序，果為朔果。
繁殖方法：地下莖繁殖。
利用部位：塊莖。
主要成分：含澱粉。
功　效：根莖為清涼滋養，製澱粉。性味甘淡、無毒、為清暑益氣、補虛強筋、清熱理肺、消腫散結、化痰解毒、健胃整腸、強化脾胃、止痢、止咳生津、止汗安神及抗癌等。為太白粉之主要原料。
產　地：南美、台灣、新竹。

編　　號：559

竹葉蘭

別　　名：桔梗欄、蝴蝶草
山管蘭、山貓兒
老鼠砒、假射干

科　　名：百合科（Liliaceae）

學　　名：*Dianella ensifolia* L. DC

生育特徵：多年生草本，葉長披針形。

繁殖方法：分枝法繁殖。

利用部位：全草或根莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：味辛性溫，有毒。拔毒、消腫。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：560

毛茛

科　　名：毛茛科
(Ranunculaceae)

學　　名：*Ranunculus ternatus* Thunb.

生育特徵：多年生草本，葉三出複葉，葉片橢圓形、披針形。開黃花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含白頭翁素（anemonin）。

功　　效：全草清熱涼血、鎮痛、鎮靜、抗痙攣、治熱毒血痢、鼻血、血痔、溫瘧等症。氣喘、氣管炎、收斂、止血、赤痢等有效。

產　　地：中國華北、東北、台灣、日本。

編　號：561

柳枝癀

別　名：柳枝黃、一枝黃花
野黃菊、黃花一枝香
科　名：菊科(compositae)
學　名：*Solidago virga-aurea* L. var. *leiocarpa*(Benth)A. Gray.
生育特徵：多年生草本植物，葉卵形、橢圓形。花頂生，腋生，開紅色花，蒴果。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草治膀胱尿道諸症，產後餘疾吐血。
產　地：台灣、新竹。

編　號：562

龍舌癀

別　名：龍舌黃、瓠瓜
一條根、葫蘆茶。
科　名：豆科（Leguminosae）
學　名：*Tadehagi tripuetrum* (L.) Ohashi
生育特徵：多年生草本。葉長橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根清涼退熱、利尿、清血、毒蛇咬傷。
產　地：台灣、新竹。

編　號：563

玄參

別　名：玄蔘、黑參
　　　　玄台、重台、元參
科　名：玄參科(Scrophulariaceae)
學　名：*Scrophwlaria ningpoensis* Hemsl.
生育特徵：多年生草本植物，根肥厚狀，莖直立，高 1.2m，葉對生，長卵形，葉長 5-10cm，葉寬 2.5-5cm。花聚繖花序，為黃綠色小花。果實卵形，蒴果 10-11 月採。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼、植物固醇、脂肪酸。
功　效：根，為滋陰降火、潤燥生津、消腫解毒、主治熱病陰傷、口渴、便秘、發瘀、喉腫、癰疽瘰癧。
產　地：中國、日本、韓國及歐洲、台灣。

編　號：564

愛玉

別　名：愛玉子、枳仔
　　　　草實子、玉枳
　　　　天拋騰、風不動。
科　名：桑科(Moraceae)
學　名：*Ficus pumila* L.
生育特徵：多年生藤蔓草本植物，葉卵形、廣卵形。
繁殖方法：扦插法繁殖。
利用部位：根、藤莖、果。
主要成分：生物鹼。
功　效：採藤袪風、利水、行血、消腫。治風濕病、關節疼痛。採果實清暑解渴。治糖尿病。
產　地：台灣野生。

猴耳

編　　號：565

科　　名：胡椒科(Piperaceae)

學　　名：*Peromia japonica* Makino.

生育特徵：多年生草本植物。叶呈橢圓形。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草止痛，敷腫毒。治打損傷、毒蛇咬傷。

產　　地：台灣、新竹。

烏藥

編　　號：566

別　　名：烏頭、附子
草烏、草烏頭

科　　名：毛茛科(Ranunculaceae)

學　　名：*Aconitum carmichaeli* Debx.

生育特徵：多年生草本，總狀花序，初夏開放，為藍色或淡紫色花，多葉莖，葉互生。

繁殖方法：實生法繁殖、塊莖繁殖。

利用部位：塊根。

主要成分：含烏頭鹼。

功　　效：葉片有毒，塊根根節最強，神經毒藥之一。為回陽逐冷、祛風濕。主治大汗亡陽、四肢厥逆、霍亂轉筋、脈微欲絕、腎陽衰弱之腰膝冷痛、陽痿、水腫。脾陽衰弱之泄瀉久痢、脘腹冷痛、形寒畏冷、精神不振以及風濕濕痺腳氣、半身不遂。

產　　地：中國大陸、台灣、新竹。

編　號：567

澤蕲

別　名：澤芹
科　名：繖形花科(Umbelliferae)
學　名：*Sium sisarum.*
英　名：Skirret
生育特徵：根芳香，莖有分枝，小葉形優美，披針形，先端漸尖，夏天開白色繖形花序。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根
主要成分：生物鹼。
功　效：春季長出的幼枝及細根可蒸煮，根可做燉煮和淹漬配冷肉乾，烘烤後可作為咖啡的代用品。澤芹變種(S.sisarum var. sisarum)成簇的根肥大，根皮灰色，味道最好。根入藥可促進排尿、清洗膀胱、治療黃疸等肝臟疾病，還可減輕胸部疼痛。澤蕲植株形似致死的毒參，常被誤認為有毒。
產　地：歐洲及東亞、台灣、新竹。

編　號：568

苦林盤

別　名：苦藍盤、苦朗、水胡滿、臭苦朗、白花苦藍盤、苦樹、許樹
科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Clerodendrum inerme*(L.) Gaertn.
生育特徵：多年生小喬本，葉橢圓形，花白色。
繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根莖。
主要成分：生物鹼。
功　效：全年採根及幹為跌打損傷，主治風濕、神經痛、膚癢、跌打。葉煎汁洗疥癬、止癢。
產　地：亞洲、台灣、新竹。

編　號：569

菊三七

別　名：紅背三七

科　名：菊科(compositae

學　名：*Gynura segetum* (L.) Merr.

生育特徵：多年生草本，直立生長或蔓生，葉覆茸毛，葉背綠或紫色，頭狀花黃桔色有臭味。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全株、根。

主要成分：生物鹼。

功　效：採嫩莖葉可食，葉片用於發熱、痢疾及腎疾的治療。採全株和根可促進血液循環、解毒及止血。

產　地：亞洲、台灣、新竹。



編　號：570

白梵天花（狗腳邊）

別　名：肖梵天花、梵天花三腳破、野棉花

科　名：錦葵科(Malvaceae)

學　名：*Urena lobata* Linn.

生育特徵：直立灌木，株高 0.5-2m，葉為單葉，互生，呈廣橢圓形，正圓形，橢圓狀長圓形或長圓形，花單生或1-4 朵生葉腋上白色。蒴果扁球形。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根莖及葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根煎服治難產、腹痛及解熱。葉為良好的止血劑，亦治便秘。花外用拔毒瘡，煎服可為潤滑劑及祛痰劑。

產　地：亞洲、台灣、新竹。



編　號：571

台灣木通

別　名：台灣野木瓜
五葉長穗木通、通木、通草

科　名：野木瓜科 (Lardizabalaceae)
(木通科)

學　名：*Akebia longeracemosa* Matsum.

生育特徵：多年生植物，葉掌狀五裂葉，小裂葉披針形。花腋生，紫色花，漿果。

繁殖方法：扦插法繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根、莖。

主要成分：含野木瓜苷（stauntonin）。

功　效：全年採根，切片，晒乾，稱本木通、烏入石、石壁。治久年風濕。民間用根及莖為強心、利尿藥，果皮亦效。

產　地：台灣山野地區、新竹。

編　號：572

七葉一枝花

別　名：草河車、青木香
七厚蓮、七葉蓮、重樓

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Paris polyphylla* Smith var. *brachystemon* Franch

英　名：Chinese Paris Rhizome

生育特徵：多年生草本，莖直立，葉 5-8 片輪生于莖頂，長圓狀披針形，倒卵狀披針形或倒披針形。花梗由莖頂抽出，頂生一花，黃色或黃綠色，蒴果。

繁殖方法：塊莖繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：含多種甾體皂苷，為薯蕷皂苷元(oliosgenin)和偏洗皂苷元(pennogenin)的二、三、四糖苷。

功　效：全年採根莖，清熱解毒、平喘止咳、熄風定驚。治癰腫疔瘡、瘰癧、喉痺、慢性氣管炎、小兒驚風抽搐、蛇傷。具有抗癌作用。

產　地：亞洲為產地、台灣、新竹。

編　號：573

細辛

別　名：馬蹄香

科　名：馬兜玲科(Aristolochiaceae)

學　名：*Asarum macranthum* Hook.f.

英　名：Asarum Chinese wild Ginger

生育特徵：多年生草本，高 10-30cm，根經橫走，捻之辛香。葉心形或腎狀心形，花紫色，蒴果，半球形。花果期 5-6 月。

繁殖方法：分株繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：根含 Eudesmin,pinoresinol,iso-arinin, essential oil3%，精油主成分為甲基丁香酚(methyeugenol)，約 5%，少量的細辛酮(asarylketone)及酚性物質等。

功　效：通竅止痛、溫肺化飲。用於風寒感冒、頭痛、牙痛、鼻塞、風濕痺痛、痰飲喘咳。

產　地：台灣及亞洲。

編　號：574

河北山藥

別　名：薯蕷、藥山藥、准山藥
山藥薯、山芋

科　名：薯蕷科(Dioscoreaceae)

學　名：*Dioscorea opposita* Thunb.

生育特徵：多年生藤本植物，塊根肉質肥厚，呈圓柱形，垂直生長，達 1m，皮灰褐色，生鬚根，蔓生。葉對生，葉腋間常生珠芽。葉呈三角狀卵形至三角狀廣卵形，花單性，雌雄異株。黃綠色穗狀花序。蒴果。

繁殖方法：塊莖及零餘子。

利用部位：塊莖。

主要成分：主成分為皂苷、黏液質、膽鹼、澱粉、糖蛋白及自由氨基酸。

功　效：味甘、性溫。除寒熱邪氣、補中益力氣、長肌肉。久服耳目聰明，輕身，不飢延年。補脾胃、強肝胃、生津止渴、平喘、澀精之功。為滋養強壯劑，微具收斂性。

產　地：河北及大陸其他地區及台灣。

編　號：575

竹仔菜

別　　名：竹節草、白竹仔菜
竹仔葉

科　　名：鴨跖草科
(Commelinaceae)

學　　名：*Commelina diffusa* Burm. f.

生育特徵：多年生草本，匍匐性，葉橢圓形、披針形。花腋生，開藍色花，蒴果。

繁殖方法：扦插法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草理白濁、清熱、散毒、利小便。其根莖敷瘡癤，葉敷腫毒、跌打。

產　　地：中國大陸、台灣、日本。

編　號：576

紅蓖麻

別　　名：蓖蔴、篦麻樹
草痲子、蓖麻仁

科　　名：大戟科(Eupforbiaceae)

學　　名：*Ricinus communis* L.

生育特徵：多年生灌木，莖、葉紅色，葉片掌狀深裂，裂片披針形。花頂生，腋生，開白花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：精油、毒蛋白質、芸香苷、蓖痲鹼（ricinine）、榆皮素。

功　　效：子，秋季採果，製蓖痲子油，為優秀之瀉劑。含有毒蛋白質，稱蓖痲白蛋白(ricin)，對腹水癌極效。根及幹，全年可採，為行血、止痛、解毒。主治盲腸炎、跌打傷、風傷、風濕、便毒、通便。葉，全年採嫩葉，治跌打、腫毒、外痔、皮膚病、散風除濕、消種毒。主治腳氣風腫不仁。

產　　地：熱帶、中國、台灣均產。

編　號：577

白尾蜈蚣草

別　　名：有苞筋骨草、筋骨草
石灰菜、散血草、八正草
百症草、白尾蜈蚣、九味一枝蒿

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Ajuga bracteosa* Wallich

英　　名：Bugpeweed

生育特徵：多年生草本，葉叢生狀，葉片匙形或倒披針形，葉緣呈疏鋸齒，兩面被短柔毛。輪繖花序，腋生，排列成總狀花序。花淡紫色或白色。小堅果橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含散血草素Ⅰ(ajugarinⅠ)，散血草素Ⅱ(ajugarinⅡ)，散血草素Ⅲ(ajugarinⅢ)油酸、亞痲油酸、葡萄糖、廣鹼等。

功　　效：全年採全草，有清熱、涼血、止血、解毒、消腫。

產　　地：中國、馬來西亞、非洲、台灣山野、新竹。

編　號：578

檸檬香蜂草

科　　名：唇形科（Labiatae）

學　　名：*Monarda citriodora*.

生育特徵：多年生草本，葉廣披針形。花頂生，腋生，開紅色花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：含精油。

功　　效：葉有香味之檸檬味，可做調味品，紅花組成蓬鬆的花頭，苞片紅色開放於夏末。其含抗菌的白里酸，可治丘疹，作感冒蒸氣吸入劑等，對噁心、氣脹和失眠有療效。又可治頭痛和發燒。全株可藥用。

產　　地：北美東部、台灣、新竹。

編　號：579

峨蔘

別　名：峨參、細葉香芹

科　名：繖形花科(Umbelliferae)

學　名：*Anthriscus cereifolium*

英　名：Chervil.

生育特徵：一年生草本植物，莖中空，分枝多，葉鮮綠色細裂，類似蕨類。花白色繖形花序，夏末葉由綠色轉為紅紫色。

繁殖方法：實生法繁殖。

主要成分：含維生素 C、胡蘿蔔素、鐵、鎂等。

功　效：採葉、枝莖有荷蘭芹氣味，可作精緻藥草的成分，新鮮葉片常用來點綴佳餚或在烹調的最後加入。葉和莖可加強綠色沙拉、食用醋及多種精緻菜餚的味道。葉泡茶可清除體內毒素，淨化各器官系統。

產　地：亞洲西部及歐洲、台灣、新竹。

編　號：580

安國山藥

別　名：准山藥、山藥
山藥薯

科　名：薯蕷科(Dioscoreaceae)

學　名：*Dioscorea opposita* Thunb

生育特徵：多年生宿根蔓性草本，莖有零餘子，葉呈卵狀披針形。

繁殖方法：塊莖及零餘子繁殖。

利用部位：塊莖及零餘子。

主要成分：皂苷。

功　效：潤肺滋腎、止咳、強胃腸。

產　地：中國大陸及台灣。

蘭嶼裸實

編　　號：581
科　　名：衛矛科
(Celastraceae)
學　　名：*Maytenus emarginata* (Willdenow) D. Hou
生育特徵：多年生灌木，株上有刺。
繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：根、莖、果。
主要成分：生物鹼。
功　　效：治各種癌症、風濕關節疼痛、跌打損傷。
產　　地：亞洲、蘭嶼、台灣、新竹。

黃連蕉

編　　號：582
別　　名：黃花曇華、曇華、蘭蕉
科　　名：曇華科（美人蕉科）
(Cannaceae)
學　　名：*Canna flaccida Salisb.*
生育特徵：多年生草本，葉互生，葉呈長橢圓形。花頂生，腋生，開黃花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖及塊莖繁殖。
利用部位：根莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根莖滋腎、解毒、破氣、通血、清熱。治肝痛、瘰癧、高血壓。
產　　地：台灣山野及亞洲各地區、新竹。

編　號：583

垂盆草

別　名：石指甲、佛指甲
黃瓜子草、雞舌草
瓜子草、狗牙草、太陽花
科　名：景天科(Crassulaceae)
學　名：*Sedum savmentosum* Bge
生育特徵：為多年生肉質草本，莖淡紅色。葉三枚輪生，倒披針形至長圓形，全緣。花呈平展二歧聚繖花序，黃色，蓇葖果。
繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含生物鹼、景天庚糖、蔗糖、果糖。
功　效：採全草鮮用清熱、消腫、解毒。治肝病、喉嚨腫痛、小火燙傷、蛇傷。
產　地：台灣山野。

編　號：584

長葉紫珠

別　名：黃毛紫珠、鬼紫珠、黃襖袍
人形葉、黃紫珠、毛紫珠
牛舌癀、佬蟹目大號紫珠
枇杷葉紫珠、野枇杷、山枇杷。
科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Callicarpa kochiana* Makino.
生育特徵：常綠或半落葉灌木，枝條粗長，枝葉密生棕褐色長茸毛。葉對生，卵狀長橢圓形至長橢圓形、披針形。聚繖花序腋生，花淡紫紅色，果球形，熟紫變白色漿質。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉、根。
主要成分：含黃酮苷、糖類、鞣質。
功　效：全年採根莖、枝葉。根有祛風、利濕、化瘀、活血、止血之效。治風寒頭痛、咳嗽、風濕疼痛、慢性風濕性關節炎、肌肉風濕症、跌打腫病、吐血、水腫。葉有收斂、止血、祛風、止咳、解毒之效。治胃出血、血小板減少性紫癜病、感冒咳嗽。外用治創傷出血、凍傷。
產　地：中國南部及西南部地區、越南及菲、日、台灣山野地區亦有。

編　號：585

穗花千金拔

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Moghania strobilifera* (L.)

英　名：Beech leaved Flemingia.

生育特徵：多年生木質草本，全株細毛。葉具托葉，長橢圓形。背有毛，蝶形花，紫紅色，總狀花序，莢果長橢圓形，有細毛。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採葉為產婦藥，浴湯用。亦治僂麻質斯。亦為小兒驅蟲劑。根治痲瘋。

產　地：原生台灣南部原野、分佈中國、印度、馬來西亞、菲律賓。

編　號：586

絞股藍

別　名：金絲五爪龍、龍鬚藤
五爪粉藤、七葉膽
五葉參、小苦藥、公羅鍋底

科　名：瓜科（葫蘆科）(Cucurbitaceae)

學　名：*Gynostemma pentaphyllum* (Thunb) Makino.

英　名：Fiveleaf Gynostemma Herb.

生育特徵：多年生攀援草本，葉掌狀複葉，互生，葉緣小齒。圓錐花序，花黃綠色，漿果球形。熟時黑色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：全草含絞股藍皀苷(gypenosido)1-52，其中3、4、8、12分別與人參皀苷Rb1,Rb3,Rd,Rf2結構同，另含黃酮。

功　效：性涼、無毒、消炎解毒、止咳祛痰、滋補強壯葯及利尿。高血壓及糖尿病。

產　地：中國、台灣、日本、韓國等地。

編　號：587

黃秋葵

別　名：秋葵、黃蜀葵、野芙葵、黃葵
科　名：錦葵科（Malvaceae）
學　名：*Abelmoschus manihot* (L.) Medic.
生育特徵：一年生直立草本，全株被毛，葉互生，莖被黃色剛毛，葉大，卵形至近圓形，掌狀分裂，有 5-9 狹長的裂片，直徑 20-30cm，邊緣細鋸齒，葉柄長 5-15cm.花單生葉腋及枝端。總狀花序，花淡黃色，心紫色，夏開花，蒴果卵狀橢圓形，種子多數。

繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：夏天採花、秋天採果實及根。
主要成分：花青素、黏液質。
功　效：採根味苦、性寒、治淋病。採花在 7-8 月採陰，花催生，治惡瘡。採子治癰腫、利小便、難產、腸炎、鎮咳。
產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：588

野菊

別　名：油菊、菊花、白菊花
路邊菊、甘菊、野菊花、甘菊花
科　名：菊科(Asteraceae)
學　名：*Chrysanthemum indicum* L.
英　名：Indian Dendranthema Flower
生育特徵：多年生草本，葉互生，卵狀三角形或卵狀橢圓形，羽狀分裂，邊緣鋸齒，兩面有毛，頭狀花序，花小，黃色。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。
利用部位：花。
主要成分：花含揮發油，油中含菊醇(chrysol)，菊酮(chrysanthenone)α-蒎烯，樟腦、龍腦、樟烯等。野菊花內酯(yejuhualactone)，野菊花素 A(artoglasin-A)，刺槐苷(acacin)，蒙花苷(linarin)，菊苷，木樨草素。
功　效：清熱解毒、治疔瘡痛腫、目赤腫痛、頭痛眩暈、霍亂、腹痛、頸淋巴腺炎腫。
產　地：中國、台灣、日本、新竹。

台灣鳶尾

編　　號：589

別　　名：鳶尾、扁竹
　　　　　藍蝴蝶、土知母

科　　名：鳶尾科(Iridaceae)

學　　名：*Iris tectorum* Maxim.

生育特徵：多年生草本，根莖匍匐多節，葉互生，劍形，花青紫色，總狀花序，蒴果長橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖及分株繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根莖，辛、苦、寒、有毒。為消積、破瘀、行水、解毒。可為吐劑、瀉劑。

產　　地：中國、台灣、新竹。

月桃

編　　號：590

別　　名：玉桃、良薑、虎子花。

科　　名：薑科（Zingiberaceae）

學　　名：*Alpinia speciosa* k. Schumann.

生育特徵：多年生草本，株高120cm，葉廣披針形，花聚合花，白色，芳香。

繁殖方法：塊莖繁殖。

利用部位：種子、根。

主要成分：種子含精油 0.96%，主成分含桉油酸。

功　　效：根治跌打損傷，久年癆傷腎虛腰痛，足痺，花可食用。種子為製仁丹之原料，芳香健胃劑。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：591

甘草

別　　名：甜草根、密草
甜草、粉甘草、白粉草。

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.

英　　名：Ligworice.Licorice Root.

生育特徵：多年生草本，全株被白色短毛或腺毛。莖直立，羽狀複葉互生，總狀花序腋生，花密集，紫紅色或藍紫色。莢果褐色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：甘草根莖含甘草甜素，甘草酸 glycyrrhizicacid 的鉀、鈣、鹽、甘草苷 liguiritin，甘草苷元 Liguiritigenin，異甘草苷 isoliguiritin，異甘草苷元 isoliguiritigenin，新甘草苷元 neo-liguiritin，新異甘草苷neoiso-liguiritin 等。

功　　效：補脾益氣、清熱解毒、祛炎止咳、調和治葯、胃脾虛弱、倦怠乏力、心悸氣短、咳嗽痰多、緩解葯物毒性。

產　　地：中國內蒙古、甘肅等省、台灣、新竹。

編　　號：592

雞血藤

別　　名：過江龍、血楓藤
豬血藤、大血藤

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Spatholobus suberectus* Dunn.

英　　名：Suberect spatholobus stem.

生育特徵：木質藤本，三出複葉，小葉寬橢圓形，圓錐花序腋生，大型，花多而密白色，莢果舌形，花果期夏秋。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：莖藤。

主要成分：含兒茶酚，揮發油，還原糖。

功　　效：採莖藤，性溫、味苦、甘，為補血、活血、通絡、月經不調、血虛萎黃、麻木癱瘓、風濕痺痛。

產　　地：中國廣東、廣西及雲南一帶、台灣、新竹。

編　號：593

五指茄

科　名：茄科
(Solanaceae)

學　名：*Solanum mammosum* L.

生育特徵：多年生灌木，多分枝，葉卵形、廣卵形。花腋生，紫色花，結條果。其果似五指故稱之。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果。

主要成分：生物鹼。

功　效：採果為治淋巴腺結咳、癰瘡腫毒、痔瘡、肺炎、肝炎、支氣管炎。

產　地：台灣、新竹。

編　號：594

半邊蓮

別　名：急解索、半邊花
細米草、蛇舌草

科　名：桔梗科(Campanulaceae)

學　名：*Lobelia chinensis* Lour.

英　名：chinense Lobelia Herb.

生育特徵：為多年生小草本，有莖纖細，乳汁，匍匐地面，節著地生根，葉互生，呈狹披針形至線形。花單生葉腋，淡紅色或淡紫色。朔果倒圓錐形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含山梗菜鹼（Lobeline），山梗菜酮鹼（Lobelanine）及皂苷、黃酮、氨基酸。

功　效：性平、味辛、採全草為利尿、消腫、清熱解毒。用於大腹水腫、面足浮腫、痛腫疔瘡、蟲咬傷、晚期血吸蟲病腹水。

產　地：中國及台灣較陰濕地區。

凹葉越橘

編　　號：595

別　　名：大葉越橘

科　　名：杜鵑科(Ericaceae)

學　　名：*Vaccinium emargmatum* Hay

生育特徵：多年生灌木至小喬木，葉片凹狀卵形、橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：葉、根。

主要成分：含槲皮素。

功　　效：根部瘤狀物，稱老鼠聯珠，功同鹿茸。葉可代越橘。為尿道消毒藥、利尿、防腐、治淋病。

產　　地：台灣、新竹。

銅錘玉帶草

編　　號：596

別　　名：普刺特草、珍珠癀

科　　名：桔梗科(Campanulaceae)

學　　名：*Pratia nummularia* (Lam) A.Br & Asch.

生育特徵：多年生草本匍匐地面，節著地生根，葉互生，近圓形，葉緣有細齒，花生葉腋，果長橢圓形，熟時紫紅色。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，祛風、利濕、活血、解毒。治風濕痙痛、跌打損傷、乳癰、無名腫毒。果實固精、順氣、消積、散瘀。治遺精、白帶、疝氣、疳積、癰腫、金瘡出血。果實亦稱地茄子。

產　　地：台灣野生潮濕地帶。



編　號：597

准山

別　名：准山藥、懷山藥
山藥、山菇、山藥薯、山芋

科　名：薯蕷科(Dioscoreaceae)

學　名：*Dioscorea opposite* Thunb.

英　名：Common Yam Rhizome.



生育特徵：多年生草本，藤蔓性，莖帶紫紅色，單葉在莖下部互生，中部以上對生。葉片卵狀三角形至寬卵狀或戟狀。花單性，雌雄異株，成細長穗狀花序。蒴果三稜狀扁圓形。

繁殖方法：塊莖繁殖

利用部位：根莖、藤及珠芽。

主要成分：主含皂苷、黏液質、胆鹼、澱粉、糖蛋白及自由氨基酸。

功　效：秋季或冬季採收塊莖，呈圓柱形，藤及株牙均可藥用。味甘、性平、健脾、補肺、固胃、益精。

產　地：中國各省、台灣。

編　號：598

萬年青

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Rhodea japonica* Roth et Kunth.

生育特徵：多年生草本，葉長橢圓形至披針形。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：可供觀賞，野生少，採根莖，剪去莖葉及鬚根，曬乾成白色，稱白河車為強心利尿，可做毛地黃葉代用品。性寒、味甘苦。治咽喉急閉、纏喉風、哮喘。

產　地：中國及台灣、新竹。

編　號：599

射干(大陸)

別　名：扁竹、山蒲扇、蝴蝶花

科　名：鳶尾科(Iridaceae)

學　名：*Belamcanda chinensis*(L.).DC

英　名：Blackberrylily Rhizome

生育特徵：多年生草本，葉 2 列，葉片對折，呈馬刀形，聚繖花序，頂生，花桔黃色有紅色斑點。蒴果三角倒卵形。花果期 7-9 月。

繁殖方法：實生法繁殖、塊莖繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：根莖含射干苷(belamcandin)，鳶尾苷(tectoridin)及射干素(shekanin)等。

功　效：採根莖性寒、味苦、有清熱解毒、降氣、祛痰、散血、消腫、通經之功。治扁桃腺炎、腫瘍、咽喉腫痛、咳逆上氣、痰涎壅塞、瘧母等。跌打、痛便。

產　地：中國、台灣。

編　號：600

小葉六神草

別　名：天文草

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Spilanthes paniculata* wall ex Dc R k Jansen

生育特徵：多年生草本，高 40-80cm，莖帶紫紅色，單葉對生，廣卵形，先端銳尖基部廣楔形，邊緣鋸齒。頭狀花序，頂生或腋生，花小，深黃色。瘦果，夏開花。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含α和β—香樹脂醇，乙酸脂等。

功　效：味辛、苦、麻舌感、微溫、止咳定喘、清腫止痛、消炎、解毒、肺結咳、百日咳、牙痛、關節痛、毒蛇傷、狂犬傷。

產　地：台灣山野濕地。